

*image
not
available*

UC-NRLF




B 5 305



16
The library of Dr. Hysseyamus.

MEDICAL SCHOOL
LIBRARY

\$



FROM THE LIBRARY OF
FRANK BRANSON PETRIE, M.D.

RECEPT-TASCHENBUCH

oder

Sammlung

der in den Kliniken des königlichen Julius-Hospitals
zu Würzburg gebräuchlichsten Recept-Formeln.

Herausgegeben

von

Dr. ANDREAS REUSS jun.,

pract. Arzt zu Würzburg, früher Assistenz-Arzt der medi-
cinischen Klinik,

und

FERDINAND CARL,

Apotheker am Julius-Hospital.

Zweite vermehrte Ausgabe.

Erlangen,

Ferdinand Enke's Verlagsbuchhandlung.

1852.

Kunstmann'scher Druck.

Vorrede.

In jeder grösseren Krankenanstalt ist es ein Bedürfniss beim Ordiniren von Arzneimitteln sich an gewisse Formeln zu halten, um bei der Häufigkeit ähnlicher krankhafter Zustände und der dadurch nöthigen ähnlichen Ordinationen die immerhin zeitraubende Receptur möglichst zu vereinfachen.

Durch vielseitigen Wunsch bestimmt, beschloss der Unterfertigte das Brauchbare des bereits Bestehenden zu sichten, das Neueste hinzuzufügen und so eine Sammlung der gebräuchlichsten Receptformeln sämmtlicher Kliniken im Julius-Hospitale zu veranstalten.

Bereits besteht eine grosse Anzahl ähnlicher Schriften; was aber ein Vorzug dieser Sammlung sein möchte, ist, dass sämmtliche Formeln im Julius-Hospitale vielfältig erprobt, also wirklich praktisch, und dass sie ferner pharmaceutisch richtig sind, zu welchem letzteren Zwecke in der juliusspitalischen Hausapotheke vielfache Versuche angestellt wurden.

Dieses Schriftchen ist zunächst nur für jene Mediciner hiesiger Hochschule berechnet, welche die Kliniken des Julius-Hospitals besuchen, um ihnen eine richtige Angabe der Mischungsverhältnisse, der Form und Gabe der üblichen Ordinationen in die Hand zu geben; vielleicht aber interessirte es auch manchen schon älteren Praktiker. —

Die Indication, wie nicht anders möglich, ist und bleibt Sache der individuellen Anschauung; nur bei den Formeln der Syphilido-Klinik und für Hautkrankheiten hielt ich eine kurze Andeutung für nöthig. Die beigefügte Taxe dürfte insbesondere den Inländern willkommen sein, bildet übrigens auch für Auswärtige einen muthmasslichen Anhaltspunkt. —

Die Eintheilung der Formeln beruht theils auf der Form der Medicamente — von der trockneren beginnend und all-

Maricualgucup.

$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$
1.	8	24	480.
	1.	3.	60.
		1.	20.
			1.

I. Classe.

Pulveres.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>1. Pulvis Aconitini.</p> <p>Rp. Aconitini puri gr. $\frac{1}{8}$ — $\frac{1}{4}$. Sacchari albi $\mathfrak{D}\beta$. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. viii. S. Alle 2—3 Stunden ein Pulver in Wasser zu geben.</p>	—	19—29
<p>2. Pulvis aërophorus.</p> <p>Rp. Acidi tartarici. Natri bicarbonici ana gr. v. Sacchari albi $\mathfrak{D}\beta$. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Brausepulver. Ein Brausepulver in ein bis zur Hälfte mit Wasser angefülltes Glas zu schütten, und während des Aufbrausens zu trinken.</p>	—	11
<p>3. Pulvis aërophorus Seidlitzensis.</p> <p>Rp. Acidi citrici crystallisati $\mathfrak{D}\beta$. dentur tales doses Nr. vi ad chartam rubram. S. Nr. 1. Rp. Natri bicarbonici gr. xiii. Tartari natronati $\mathfrak{D}\beta$. dentur tales doses Nr. vi ad chartam albam. S. Nr. 2. Ein Pulver von Nr. 1 in rothem Papier mit einem Pulver von Nr. 2 in weissem Papier unter Zuckerwasser zu mischen und während des Aufbrausens zu trinken.</p>	—	15
	—	15

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
4. Pulvis alterans Plumeri. Rp. Calomelanos Sulfuris aurati antimonii ana gr. $\frac{1}{4}$ — gr. 1. Sacchari albi $\mathfrak{z}\beta$. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Alle 2 — 3 Stunden ein Pulver zu nehmen.	—	9—10
5. Pulvis antepilepticus Marchionis. Rp. Pulveris radicis paeoniae. „ dictamni albi. „ oculorum cancrorum „ visci albi. „ sacchari albi ana 3i. Misce fiat pulvis, detur ad scatulam. S. Täglich 3 — 4 Messerspitzen voll zu nehmen.	—	13
6. Pulvis antepilepticus Hufelandi. Rp. Zinci oxydati albi gr. i — gr. vi. Extracti herbae hyoscyami gr. i. Olei valerianae gtt. i — ii. Pulveris radiceis valerianae 3β — 3i. Misce fiat pulvis, dentur tales Nro. iv ad chartam ceratam. S. Früh und Abends ein Pulver zu geben.	—	14—20
7. Pulvis antepilepticus Ragoloi. Rp. Pulveris radiceis valerianae $3i\beta$. „ foliorum aurantiorum 3β . „ salis ammoniaci dep. 3ii. „ magnesia carbonicae Olei cajeputi ana $\mathfrak{z}\text{ii}$. Misce fiat pulvis, detur ad vitrum. S. Täglich 2mal einen Theelöffel voll zu geben.	—	42

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>8. Pulvis antihelminthicus.</p> <p>Rp. Santonini puri gr. i—ii. Sacchari albi $\mathfrak{D}\beta$. (Elaeosacchari cynae $\mathfrak{D}\beta$). Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. viii.</p> <p>S. Stündlich ein Pulver in einer Oblate mit Wasser zu nehmen.</p>	—	25—41 26—42
<p>9. Pulvis aromaticus.</p> <p>Rp. Pulveris corticis cinnamomi ceyl. $\mathfrak{Z}\text{ii}$. " caryophyllorum " nucum moschat. ana gr. 45. " macidis $\mathfrak{Z}\beta$. " radicis zingiberis gr. 45. " ligni santali rubri $\mathfrak{Z}\text{ii}$. " sacchari albi $\mathfrak{Z}\text{viii}$. Misce fiat pulvis. Detur usui.</p>	1	17
<p>10. Pulvis Berberini.</p> <p>Rp. Berberini puri gr. i—ii. Sacchari albi $\mathfrak{D}\beta$. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi.</p> <p>S. Täglich drei Pulver zu nehmen.</p>	—	20—31
<p>11. Pulvis Camphorae.</p> <p>Rp. Camphorae tritae gr. $\frac{1}{2}$—ii. Pulv. Gummi arabici " sacchari albi ana gr. v. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi.</p> <p>S. Nach Verordnung.</p>	—	9—10

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
12. Pulvis Castorei moscowitici. Rp. Castorei moscowitici gr. $\frac{1}{2}$ — gr. 2. Sacchari albi $\mathfrak{D}\beta$. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Alle 2—3 Stunden ein Pulver zu nehmen.	— 1	32 44
13. Pulvis Chinae compositus. Rp. Pulveris corticis chinae regiae „ radiceis rhei moscow. „ „ colombo ana gr. v Elaecosacchari corticum aurantium $\mathfrak{D}\beta$. Misci fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. 2—3mal des Tages ein Pulver zu nehmen.	—	15
14. Pulvis Chinini sulfurici. Rp. Chinini sulfurici gr. i. Elaecosacchari cinnamomi gr. v. Misce fiat pulvis. Quaevis dosis crescat dimidio grani chinini sulfurici. Dentur doses Nro. v. S. 1. 2. 3. 4. 5 S. Das erste Pulver 6 Stunden, das zweite 5, das dritte 4 u. s. f. vor dem Anfall zu nehmen.	—	23
15. Pulvis Chinini sulfurici. Rp. Pulveris chinini sulfurici gr. i—iii. Sacchari albi $\mathfrak{D}\beta$. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Nach Verordnung zu nehmen	—	20—44
Eodem modo paratur 16. Pulvis Chinini valerianici.		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>17. Pulvis Doweri compositus.</p> <p>Rp. Pulveris Opii puri „ radicis ipecacuanhae ana gr. $\frac{1}{4}$. „ Kali sulfurici gr. iii. „ „ nitrici gr. v. „ sacchari albi $\mathfrak{D}\beta$. Misce fiat pulvis. Dentur tales doses Nro. vi. S. Nach Verordnung.</p>	—	11
<p>18. Pulvis Doweri simplex seu Pulvis Ipecacuanhae opiatuſ</p> <p>Rp. Pulveris opii puri gr. $\frac{1}{8}$. „ radicis ipecacuanhae gr. $\frac{1}{4}$. Sacchari albi gr. v. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. viii. S. Täglich 3—4 Pulver zu nehmen.</p>	—	10
<p>19. Pulvis emeticus.</p> <p>Rp. Tartari emetici gr. i. Pulveris radicis ipecacuanhae gr. xv—$\mathfrak{D}\mathfrak{i}$. Sacchari albi $\mathfrak{D}\beta$. Misce fiat pulvis. DS. Auf 2mal in Wasser zu nehmen.</p>	—	5—6
<p>20. Pulvis Ferri alcoholisati.</p> <p>Rp. Limaturae martis alcoh. Pulveris radicis rhei ana gr. v. Elaeosacchari calami arom. $\mathfrak{D}\beta$. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. viii. S. Täglich ein Pulver zu verbrauchen, die eine Hälfte Morgens, die andere Abends.</p>	—	17

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
21. Pulvis Ferri carbonici. Rp. Ferri carbonici oxydulati. Pulveris aromatici ana $\mathfrak{D}\mathfrak{J}$. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. viiij. ad vitra. S. Dreimal täglich ein Pulver zu nehmen.	—	36
22. Pulvis Ferri hydrocyanici. Rp. Ferri hydrocyanici gr. i—iii. Elaeosacchari cinnamomi $\mathfrak{D}\mathfrak{J}$. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Dreimal täglich ein Pulver zu nehmen.	—	11—13
23. Pulvis Ferri phosphorici. Uti pulvis ferri hydrocyanici.		
24. Pulvis florum Benzoës. (acidi Benzoici.) Rp. Acidi benzoici gr. i — gr. ii. Sacch. albi $\mathfrak{D}\mathfrak{J}$. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Alle 2 Stunden ein Pulver nehmen.	—	11—14
25. Pulvis foliorum Uvae Ursi kalinus. Rp. Pulveris foliorum uvae ursi $\mathfrak{Z}\mathfrak{i}\mathfrak{i}\mathfrak{i}$. Kali carbonici depurati $\mathfrak{Z}\mathfrak{i}$. Sacchari lactis $\mathfrak{Z}\mathfrak{J}$. Misce fiat pulvis, detur ad vitrum. S. Täglich 2—3mal eine starke Messerspitze voll zu nehmen.	—	12

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>26. Pulvis herbae Sabinæ cum Boraco.</p> <p>Rp. Pulveris herbae sabinæ. „ rad. rhei ana ʒii. Boracis veneti ʒß. Elaeosacchari macidis ʒi. Sacchari albi ʒß. Misce fiat pulvis, detur ad scatulam. S. Des Tags 2mal einen kleinen Theelöffel voll zu nehmen.</p>	—	35
<p>27. Pulvis Indigi.</p> <p>Rp. Indigi optimi sub. pulv. ʒß. Pulveris aromatici ʒi. Misce fiat pulvis, detur ad scatulam. S. Dreimal täglich einen Theelöffel voll zu nehmen.</p>	—	23
<p>28. Pulvis Kermectis mineralis cum Moscho.</p> <p>Rp. Sulfuris stibiati rubri (kerm. min.) gr. ½. Moschi tonquinensis gr. i. Sacchari alb. ʒß. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Stündlich ein Pulver zu nehmen.</p>	1	59
<p>29. Pulvis Lactucarii germanici. uti Pulvis Opii.</p>		
<p>30. Pulvis laxans.</p> <p>Rp. Calomelanos gr. v—x. Pulveris radices jalappae ʒi. Sacchari albi ʒß. Misce fiat pulvis. d. ad capsulam. S. Auf 1mal in Oblate zu nehmen.</p>	—	6—7

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
31. Pulvis limonade. Rp. Acidi tartarici 3β. Elaeosacchari citri 3ii. Sacchari albi 5ii. Misce fiat pulvis. D. usui.	—	23
32. Pulvis Liquiritiae compositus. Rp. Pulveris foliorum sennae „ radicis liquiritiae ana 31β. Sacchari albi 3ix. Pulv. seminis anisi 3β. Florum sulfuris lot. 3i. Misce fiat pulvis. D. S. Theelöffelweiss zu nehmen.	—	19
33. Pulvis Magisterii Bismuthi. (bismuth. nitric. ppt.) Rp. Bismuthi nitrici praecipitati gr. i—iii. Sacchari alb. 9β. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Alle 2—3 Stunden ein Pulver zu nehmen.	—	9—11
34. Pulvis Morphii acetici. Rp. Morphii acetici gr. 1/3—1/4. Sacchari albi gr. v. Misce fiat pulvis. D. S. Schlafpulver.	—	3—4
35. Pulvis Morphii acetici cum Agarico. Rp. Morphii acetici gr. 1/3. Boleti laricis gr. ii. Plumbi acetici cryst. gr. 1/4. Elaeosacchari citri gr. v. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Abends ein Pulver zu nehmen.	—	13

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>36. Pulvis cum Moscho.</p> <p>Rp. Mosch. touquinensis gr. $\frac{1}{2}$ — 2 gr. Sacchari albi $\mathfrak{D}\beta$. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Nach Verordnung.</p>	1 3	2 44
<p>37. Pulvis cum oleo Crotonis Tiglii.</p> <p>Rp. Olei crotonis tiglii gtt. i — iii. Sacchari albi \mathfrak{Zi}. Misce fiat pulvis, divide in partes aequales Nr. viii. S. Alle 1 — 2 Stunden ein Pulver in Oblate zu nehmen.</p>	—	9 — 11
<p>38. Pulvis Opii.</p> <p>Rp. Opii puri pulverisati gr. $\frac{1}{4}$ — 1. Sacchari albi $\mathfrak{D}\beta$. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. viii. S. Alle 1 — 3 Stunden ein Pulver zu nehmen.</p>	—	11 — 12
<p>39. Pulvis Plumbi acetici opiatu.</p> <p>Rp. Plumbi acetici crystallisati gr. i. Opii puri gr. ii. Sacchari albi $\mathfrak{D}\text{iv}$. Misce fiat pulvis, divide in partes aequales Nro. viii. S. Alle drei Stunden ein Pulver zu geben.</p>	—	12
<p>40. Pulvis pro infantibus sec. Hufeland.</p> <p>Rp. Magnesiae carbonicae \mathfrak{Zii}. Pulveris radidis rhei $\mathfrak{Z}\beta$. " " valerianae gr. viii. Elaeosacchari foeniculi \mathfrak{Zi}. Misce fiat pulvis, detur ad scatulam. S. Früh und Abends eine Messerspitze voll zu nehmen.</p>	—	15

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
41. Pulvis resolvens. Rp. Kali sulfurici Magnesiae albae Pulveris rad. rhei moscow. Elaeosacchari menth. crisp. ana 3i. Misce fiat pulvis, detur ad scatulam. S. Täglich 3—4 Messerspitzen voll zu nehmen.	—	19
42. Pulvis Rhei compositus seu stomachicus. Rp. Tartari tartarisati Pulveris radiceis rhei mosc. „ flaved. corticum aurantiorum ana 3i. „ sacchari albi 3ß. Olei Cajeputi gtt. iv. Misce fiat pulvis, detur ad scatulam. S. Täglich einen bis zwei Theelöffel voll zu nehmen.	—	22
43. Pulvis Salicini. Rp. Salicini gr. 1—2. Sacchari albi 9ß. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Alle 1—2 Stunden ein Pulver zu nehmen.	—	20—32
44. Pulvis Santonini. vide Pulv. antihelminth.		
45. Pulvis Sulfuris aurati comp. Rp. Sulfuris aurati antimonii Pulv. radiceis squillae marit. ana gr. 3. „ herbae digitalis purp. gr. i. „ aromatici gr. vi. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Alle drei Stunden ein Pulver zu nehmen.	—	13

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>46. Pulvis Secalis cornuti.</p> <p>Rp. Secal. cornuti Boracis veneti Pulveris corticis cinnamomi ana gr. v. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Alle $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{2}$ Stunden ein Pulver zu geben.</p>	—	13
<p>47. Pulvis Sellii.</p> <p>Rp. Florum sulfuris lot. Pulveris radialis rhei mosc. Magnesiae carbonicae ana 3ß. Pulv. cremoris tartari Elaeosacchari macidis ana 3iß. Misce fiat pulvis, detur ad scatulam. S. Täglich 3—4 Messerspitzen voll zu nehmen.</p>	—	15
<p>48. Pulvis Strychnini.</p> <p>Rp. Strychnini puri gr. $\frac{1}{16}$ — $\frac{1}{12}$. Sacchari albi 9ß. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. viii. S. Alle 3 bis 4 Stunden ein Pulver zu nehmen.</p>	—	13—14
<p>49. Pulvis Tannini opiatu.</p> <p>Rp. Tannini puri gr. ii. Extracti opii aquosi gr. $\frac{1}{4}$. Sacchari albi 9ß. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Alle 1—2 Stunden ein Pulver zu nehmen.</p>	—	14

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>50. Pulvis temperans.</p> <p>Rp. Kali nitrici gr. v. Tartari depurati gr. x. Sacchari albi \mathfrak{D}i. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. vi. S. Des Tags mehrmals ein Pulver in Wasser zu nehmen.</p>	—	11
<p>51. Pulvis Zinci oxydati albi.</p> <p>Rp. Zinci oxydati albi gr. i—gr. ii. Magnesiae carbonicae gr. v. Sacch. albi \mathfrak{D}/3. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. viii. S. Alle 2 bis 3 Stunden ein Pulver zu nehmen.</p>	—	12—14
<p>52. Pulvis Zinci hydrocyanici.</p> <p>Rp. Zinci hydrocyanici gr. $\frac{1}{16}$—$\frac{1}{8}$—$\frac{1}{4}$. Sacchari alb. gr. v. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. viii. S. Alle 3—4 Stunden ein Pulver zu geben.</p>	—	9—10 —12
<p>53. Pulvis Zinci valerianici.</p> <p>Rp. Zinci valerianici gr. i—ii. Sacchari alb. \mathfrak{D}/3. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nro. viii. S. Alle 2—3 Stunden ein Pulver zu nehmen.</p>	—	24—40

II. Classe.

Species.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
54. Species antihydropicae. Rp. Baccarum juniperi Radicis ononidis spin. ana $\text{ʒi}\beta$. Specierum lignorum ʒiii . Conc. et contus. misce fiat species. DS. Mit Wasser $\frac{1}{4}$ Stunde lange zu kochen und lau- warm halbtassenweis zu trinken.	—	23
55. Species diureticae Rombergi. Rp. Radicis levistici Baccar. juniperi ana ʒii . Conc. cont. misce fiat species. DS. Die Hälfte hievon mit 1 Maas kochenden Was- sers zu übergießen, $\frac{1}{2}$ Stunde stehen zu lassen, und des Tags über lauwarm zu trinken.	—	14
56. Species lignorum. Rp. Ligni gnajaci rasp. sassafras Radicis liquiritiae ana ʒi . " caricis arenariae " bardannae ana ʒii . $\frac{1}{2}$ Stipit. dulcamarae Rad. saponariae ana ʒi . Concis. misce fiat species. DS. Eine starke Handvoll mit 2 Maas Wasser $\frac{1}{2}$ Stunde lang auf 1 Maas einzukochen und Tags über zu trinken.	—	42

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>57. Species Loweri.</p> <p>Rp. Avenae decorticat. $\mathfrak{z}\text{iv}$. Rad. sassaparill. $\mathfrak{z}\text{ii}$. „ cichorei $\mathfrak{z}\text{i}$. Conc. et cont. m. f. species.</p> <p>DS. Die Hälfte hievon mit 2 Maas Wasser auf eine Maas einzukochen und Tags über lauwarm zu trinken.</p>	—	46
<p>58. Species nervinae.</p> <p>Rp. Radic. valerian. min. „ caryophyllat. Herbae menth. crisp. Foliorum aurant. ana $\mathfrak{z}\text{vi}$. Conc. misce fiat species.</p> <p>DS. Eine kleine Handvoll mit 2—3 Tassen kochenden Wassers zu übergießen, 1 Stunde lang stehen zu lassen, dann abzugießen, und Morgens und Abends die Hälfte kalt zu trinken.</p>	—	20
<p>59. Species pectorales cum fructibus.</p> <p>Rp. Passul. majorum $\mathfrak{z}\text{i}$. Siliquae dulcis $\mathfrak{z}\text{x}$. Dactylorum $\mathfrak{z}\text{ii}$. Caricarum $\mathfrak{z}\text{ii}\mathfrak{z}$. Hordei mundati $\mathfrak{z}\text{i}$. Radicis liquiritiae Herb. capillor. ven. ana $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$. „ malvae $\mathfrak{z}\text{ii}$. Concis. misce fiat species.</p> <p>DS. Eine Handvoll mit einer Maas Wasser zu sieden und Tags über öfters davon zu trinken. —</p>	—	39

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>60. Species pectorales ordin.</p> <p>Rp. Rad. althaeae „ graminis ana $\frac{3}{i}$. „ taraxaci Stipitum dulcam. ana $\frac{3}{\beta}$. Rad. liquiritiae $\frac{3}{vi}$. Foliorum sennae $\frac{3}{ii}$. Seminis foeniculi $\frac{3}{i}$. Concls. contus. m. f. species.</p> <p>DS. Eine Handvoll auf 1 Maas Thee einzukochen und öfters davon zu trinken.</p>	—	23
<p>61. Species pro infantibus.</p> <p>Rp. Hord. perlati Rasur. corn. cervi ana $\frac{3}{ii}$. Sacch. lactis $\frac{3}{\beta}$. Conc. cont. m. f. species.</p> <p>DS. Mit hinreichender Menge Wassers auf $\frac{1}{2}$ Maas einzukochen und während des Tags zum Getränk zu geben.</p>	—	7

III. Classe.

Pilulae.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>62. Pilulae adstringentes.</p> <p>Rp. Pulveris terrae catechu „ aluminis crudi ana 3i. Extracti chinae fusc. 3ß. Mucilaginis gummi arabici quantum satis, ut fiat massa pilularum, e qua formentur pilu- lae ponderis gr.ii. Conspergantur pulvere corticis cinnamomi.</p> <p>DS. Früh und Abends 10 Pillen zu nehmen.</p>	—	26
<p>63. Pilulae aloëticae.</p> <p>Rp. Extracti aloës aquosi Saponis medicat. ana ℥i. Ext acti rhei q. satis (℥i). ut fiant pilulae Nro. xx. Cons. pulv. cort. cinnamomi.</p> <p>DS. Dreimal des Tags drei Stücke zu nehmen.</p>	—	17
<p>64. Pilulae aloëticae compositae.</p> <p>Rp. Extracti rhei mosc. ℥ii. „ aloës aquosi ℥i. Saponis jalappin. medicat. ana 3ß. M. f. m. „ pilularum, e qua formentur pil. Nro. 60. Cons. pulv. liquiritiae.</p> <p>DS. Abends 5 Stücke zu nehmen.</p>	—	45

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>65. Pilulae Ammoniaci (gummi res.) compositae. (Pilulae emmenagogae.)</p> <p>Rp. Gummi resinae ammoniaci 3iβ. " asae foetidae 3β. Extracti aloës aquosi ʒi. Pulveris croci sativi ʒβ. Extracti chamomillae q. s. (3iβ). ut f. massa pil. e qua form. pil. pond. gr. ii. Consp. pulv. cinnam.</p> <p>DS. Abends 5 Stücke zu geben.</p>	—	40
<p>66. Pilulae anglicae.</p> <p>Rp. Pulv. aloës succotrin. 3β. " cremoris tartari Florum sulfuris. l. ana 3i. Saponis veneti 3ii. Ol. citri gtt. v. Extracti taraxaci q. s. (3iii). ut f. mass. pil. e qua form. pil. pond. gr. iv. Consp. pulv. lycopod.</p> <p>DS. Täglich 1 bis 2mal 1 bis 2 Pillen zu nehmen.</p>	—	48
<p>67. Pilulae ex Argento nitrico fuso.</p> <p>Rp. Argenti nitrici fusi ʒβ. Pulveris opii puri gr. v. Extracti conii maculati 3ii. Pulveris radicia liquiritiae 3ii et gr. v. M. f. mass. e qua formentur pilulae Nro. 100. (pil. una cont. 1/10 Gran argent. nitric. fus.) Consp. pulv. lycopod.</p> <p>S. Anfangs täglich 1 Pille und allmählig steigend bis 10 Pillen zu nehmen.</p>	—	40

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
68. Pilulae arsenicales. (Pil. asiaticae.) Vide Abtheil. IV. Formeln für Hautkrankheiten.		
69. Pilulae ex Asa foetida. Rp. Pulv. gummi resin. asae foetidae 3i. Extracti valerianae 3/3. M. f. pilulae pond. gr. ii. Consp. pulv. cort. cinnamom. DS. Dreimal täglich 5 Pillen zu nehmen.	—	15
70. Pilulae e balsamo Copaivae. Vide form. syph. Abth. III.		
71. Pilulae e Brucino. Rp. Brucini puri gr. xv. Pulv. rad. liquiritiae 3/3. Extracti chamomill. q. s. ut fiant pilul. Nro. 30. Consp. pulv. liquiritiae. DS. Täglich dreimal eine Pille zu nehmen und damit allmählig zu steigen.	—	56
72. Pilulae e Camphora cum Opio. Rp. Camphorae trit. ℥ii. Extracti opii aquosi gr. viii. M. f. c. mucil. gg. arabici pilul. Nro. xvi. Consp. lycopodio. DS. Abends 1—3 Pillen zu nehmen.	—	17

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>73. Pilulae Colocyntid. comp.</p> <p>Rp. Extr. colocyntid. 3i. Pulv. rad. squillae " aloës succotrin. ana 3/3. M. f. c. mucilag. gummi arabici massa pilularum, e qua formentur pil. Nro. 60. Consp. pulvere cinnamomi.</p> <p>DS. Mehrmals des Tags eine Pille zu nehmen.</p>	—	32
<p>74. Pilulae e Conio maculato.</p> <p>Rp. Extr. conii maculati " aloës aquos. Saponis medicati ana ʒii. M. f. pil. pond. gr. ii. Consp. pulvere rad. liquirit.</p> <p>DS. Morgens und Abends 3 Pillen zu nehmen.</p>	—	20
<p>75. Pilulae e Creosoto.</p> <p>Rp. Creosoti 3i. Pulv. rad. althaeae " succi liquiritiae ana 3i/3. Aquae dest. q. s. ut fiat massa pilularum, e qua f. p. pond. gr. ii. Consp. pulv. liquiritiae.</p> <p>DS. Morgens und Abends 2 Pillen zu nehmen. (ad vitrum).</p>	—	25
<p>76. Pilulae extract. Cynae. (Pilulae antihelminth.)</p> <p>Rp. Extracti sem. cynae aeth. Pulv. sem. cynae ana ʒi. M. f. m. pil., e qua formentur Nro. 20. Consp. pulv. rad. calami aromat.</p> <p>DS. Früh und Abends 10 Pillen zu nehmen.</p>	—	21

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
77. Pilulae ex Ergotino. Rp. Ergotini \mathfrak{z} i. Pulv. cort. cinnamom. Extract. ratanhiae ana $\mathfrak{z}\beta$. M. f. c. muc. gg. arab. q. s. pil. Nro. xx. Consp. pulv. cort. cinnamomi. DS. 4—5 Pillen pro dosi.	—	31
78. Pilulae e Fell. tauri. Rp. Fellis tauri inspissati siccati Extract. gentianae Pulv. rad. rhei moscow. ana \mathfrak{z} i. M. f. pil. pond. gr. ii. Consp. pulvere cinnamomi. DS. Dreimal 3 Pillen zu nehmen.	—	29
79. Pilulae e Ferro et Ammonio muriatico. Rp. Florum salis ammoniaci martial. $\mathfrak{z}\beta$. Pulv. gg. res. galbani $\mathfrak{z}\mathfrak{i}\beta$. „ aloës succotrin. \mathfrak{z} i. „ croci sativ. $\mathfrak{z}\beta$. Extr. chamomillae q. s. ($\mathfrak{z}\mathfrak{i}\beta$). ut fiant pil. pond. gr. ii. Consp. pulv. cinnamomi. DS. 1 bis 2mal täglich 5 Pillen zu nehmen.	—	37
80. Pilulae e Ferro carbonico saccharato. (Pil. Valetii.) Rp. Ferri carbonic. sacch. recent. parat. Mellis despumati et inspissati ana \mathfrak{z} ii. Pulv. rad. alth. q. s. (\mathfrak{z} i). ut fiat massa pilularum, e qua formentur pil. Nro. 120. Consp. pulv. cort. cinnamomi. DS. 1 bis 2mal 5 Stücke zu nehmen. (quaevis pilula continet ferri carb. saccharat. gr. i).	—	33

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
81. Pilulae e Ferro phosphorico. Rp. Ferri phosphorici Pulv. cort. chinae reg. ana 3i. Bals. peruvian. nigr. 3ß. Extracti chinae frig. par. q. s. (3i). ut f. mass. pil. e qua form. pil. pond. gr. ii. Consp. pulv. cort. cinnamomi. DS. Abends 5 Pillen zu nehmen.	1	13
82. Pilulae e Ferro puro limato. (Pilulae martiales). Rp. Ferri alcoholisati Pulv. rad. rhei ana 3i. Extract. gentian. q. s. (3i/3). ut fiant pilulae pond. gr. ii. Consp. pulv. cort. cinnam. DS. Dreimal des Tags 3 Stücke zu nehmen.	—	31
83. Pilulae e Ferro sulfurico. Rp. Ferri sulfurici puri Gg. resin. galbani ana 3i/3. Extract. amar. q. s. (3i). ut f. pil. pond. gr. ii. Consp. pulv. cinnamomi. DS. 2 bis 3mal des Tags 2—3 Pillen zu nehmen.	—	26
84. Pilulae ferruginosae compositae. (Canstatt.) Rp. Ferri sulfuric. cryst. Kali carbon. dep. Pulv. rad. liquirit. Succ. liquiritiae d. ana 3i. M. f. c. aq. dest. mass. pilul. e qua form. pond. gr. ii. Consp. pulv. cort. cinnamomi. D. ad vitrum. S. 1 bis 2mal 5 Stück zu nehmen.	—	22

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
85. Pilulae Extract. filicis maris aeth. Rp. Extr. filicis maris aeth. Pulv. rad. filic. mar. rec. parat. ana ℥i. M. f. pilul. Nro. xx. Consp. pulv. rad. calam. arom. D. ad vitrum. S. Früh und Abends 10 Stück zu nehmen.	—	23
86. Pilulae e res. Guajaci. (Pil. antiarthriticae). Rp. Gg. res. guajaci pulv. 3℔. Saponis medicati ℥i. Extract. aconiti „ aloës aquos. ana ℥℔. „ cardui bened. q. s. ut fiant pilulae pond. gr. ii. Consp. pulv. liquiritiae. DS. Täglich 1 bis 2mal 5 Stücke zu nehmen.	—	15
87. Pilulae Heimii. (P. antihydropicae). Rp. Gg. resin. guttae pulv. Sulfuris aurat. antimonii Pulv. rad. squillae (Pulv. herb. digitalis) Extr. pimpinellae ana ℥℔. M. f. pilul. Nro. xx. Consp. pulv. lycopodii. DS. Alle 3 Stunden eine Pille, bis wässrige Stühle erfolgen.	—	13— (15)
88. Pilulae jalappinae. Rp. Resinae jalappae Pulv. rad. jalappae Saponis medicat. ana ℥i. M. f. pil. Nro. xxx. Consp. pulv. lycopodii. DS. Drei bis fünf Pillen auf einmal zu nehmen.	—	16

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
89. Pilulae mercuriales Dzondi. vide Abth. III. form. syph.		
90. Pilulae mercuriales in nosocomio Julii usitatae. vide Abth. III. form. syph.		
91. Pilulae mercuriales jodat. vide Abth. III. form. syph.		
92. Pilulae mercuriales purgantes Rp. Calomelanos ʒi. Sapon. jalappin. ʒi. Pulv. rad. jalapp. q. s. (ʒii) ut f. pil. pond. gr. ii. Consp. pulv. lycopodii. DS.	—	29
93. Pilulae e Myrrha comp. (Pil. emmenagogae). Rp. Gg. resin. myrrh. elect. pulv. Ferri lactici oxydulati Extr. aloës aquosi ana ʒi. " cardui benedicti q. s. (ʒi). ut fiant pilul. pond. gr. ii. Consp. pulv. cort. cinnamomi. DS. 2mal 5 Pillen zu nehmen.	—	53
94. Pilulae extract. Nucis vomicae. Rp. Extract. nucis vomicae spirituos. gr. x. Extract. gentian. ʒβ. Pulv. rad. alth. q. s. ut f. pil. Nro. xxx. Consp. pulv. cort. aurantior. DS. 3mal 2—3 Stücke zu nehmen.	—	15

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>95. Pilulae ex oleo Crotonis Tigl. comp.</p> <p>Rp. Olei crotonis tigllii gtt. v. tere cum mucilag. gg. arab. q. s., ut fiat cum Extr. nucis vomicae sp. Pulv. flaved. cort. aurant. ana ℥i massa pilularum, e qua form. pilulae Nro. xx. Consp. pulv. flaved. cort. aurant. D. ad vitrum.</p> <p>S. Täglich ein- oder zweimal 1 Pille zu nehmen.</p>	—	24
<p>96. Pilulae opiatæ.</p> <p>vide Abth. II. Formul. extern.</p>		
<p>97. Pilulae e Quassia.</p> <p>Rp. Extracti quassiae 3℔. Pulv. ligni quassiae „ cort. cinnamom. ana ℥i. Extract. trifolii fibrin. q. s. ut fiant pilul. pond. gr. ii. Consp. pulvere corticis cinnamomi.</p> <p>DS. 2mal 5 Pillen zu nehmen.</p>	—	21
<p>98. Pilulae e Rheo.</p> <p>(Pil. resolventes).</p> <p>Rp. Pulv. rad. rhei moscow. Extr. rhei aquos. ana ℥ii. M. f. pil. Nro. 40. Consp. pulv. liquiritiae.</p> <p>DS. Dreimal 5 Pillen zu nehmen.</p>	—	27

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>99. Pilulae Rufi.</p> <p>Rp. Aloës succotrin. Gg. res. ammoniac ana 3i. " " myrrhae 3ß. (Salis therm. carolinens. 9ii). M. f. c. mucil. gg. arab. pilul. pond. gr. ii. Consp. pulv. cort. cinnamomi. DS. 2 bis 3mal 5 Pillen zu nehmen.</p>	—	21
<p>100. Pilulae e Salicino.</p> <p>Rp. Salicini puri 9i. Extract. trifolii fibrin. 3i. Pulv. cort. chin. reg. q. s. (9ii). ut f. pil. Nr. 50. Consp. pulv. cort. cinnamomi. DS. Alle 3 Stunden 6 Stück zu nehmen.</p>	—	60
<p>101. Pilulae terebinthinatae.</p> <p>Rp. Olei terebinthinae Pulv. gg. arabici ana 3ß. Succi liquiritiae, d. 3i. M. f. l. a. pilulae pond. grii. Nr. 60. Consp. pulv. cinnamomi. D. ad vitrum. S. Tags über 2 bis 3mal eine Pille zu nehmen. (quaevis pilula continet gr. 3 olei terebinthinae).</p>	—	12
<p>102. Pilulae ex Urea nitrica.</p> <p>Rp. Ureae nitricae gr. xviii. Conservae rosarum 9ß. Pulv. rad. liquirit. q. s. ut fiant pilulae Nr. xii. Consp. pulv. flaved. cort. aurant. DS. Früh und Abends 3 Stück zu nehmen.</p>	—	25

IV. Classe.

Electuaria.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>103. Electuarium antihelminthicum.</p> <p>Rp. Pulveris sem. cynae „ kali sulfurici ana 3ii, „ rad. valerianae 3i. „ „ jalappae 3ß. Oxymellis squillae 3ß. Mellis despumati q. s. (3x.) ut fiat electuarium molle. Detur ad ollam.</p> <p>S. Des Tags 4mal einen Theelöffel voll.</p>	—	25
<p>104. Electuarium antihydopicum.</p> <p>Rp. Tartari depurati 3ß. Roob juniperi „ sambuci Oxymellis squillae ana 3ß. Pulpae tamarindorum 3iß. Misce fiat electuarium.</p> <p>DS. Alle 2 Stunden einen Theelöffel voll.</p>	—	33
<p>105. Electuarium e Senna. (Elect. lentivum).</p> <p>Rp. Pulv. folior. sennae 3ß. „ tartari dep. 3iß. Pulpae tamarindorum 3i. Syrupi simplicis 3ii. Misce ut fiat elect. molle.</p> <p>DS. Theelöffelweis zu nehmen.</p>	—	17

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
106. Electuarium mundificans Werlhoffi. Rp. Pulveris rad. sassaparillae 3vi. " ligni guajaci 3ii. " folior. sennae 3iii. " radicis rhei 3i/3. " ligni sassafras " seminis anisi ana gr. xv. Mellis despumati 3iv/3. Misce ut fiat electuarium molle. DS. Theelöffelweis.	1	6
107. Electuarium purgans. Rp. Pulv. radicis jalappae " fol. sennae " kali sulfurici ana 3i/3. Pulpae tamarindorum 3i. Syrupi spinæ cerv. 3/3. Misce fiat elect. molle. DS. Theelöffelweis, bis Wirkung erfolgt.	—	27
108. Electuarium resolvens. Rp. Cremoris tartari 3ii. Roob sambuci 3/3. Pulpae tamarind. 3ii. Misce fiat electuarium. DS. Theelöffelweis.	—	27

V. Classe.

Gelatinae.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>109. Gelatina Cornu Cervi. Rp. Cornu cervi rasp. albi ℥iii. Coque per horam unam aquae fontanae suffi- ciente quantitate ad colaturam ℥vi. tunc evapora ad consistentiam gelatinae et adde Syrupi citri seu „ rubi idaci ℥i. M. D. ad ollam. S. Kaffeelöffelweis zu nehmen.</p>	—	35 od. 31
<p>110. Gelatina lichenis Carragheen. Rp. Lichenis carragheen ℥i. Coque per horam dimidiam aquae fontanae ℥xvi ad colaturam ℥viii. tunc evapora ad consistentiam gelatinae et adde Syrupi citri seu „ rubi idaci ℥i. „ Misce. Detur ad ollam. S. Kaffeelöffelweis.</p>	— —	33 od. 29
<p>111. Gelatina lichenis islandici. Rp. Lichenis islandici amarit. deliberati ℥ii. Coque aquae font. ℥xii ad colaturam ℥vi. tunc evapora ad consistentiam gelatinae et adde Syrupi citri seu „ rubi idaci ℥i. „ Misce. Detur ad ollam. S. Kaffeelöffelweis.</p>	— —	35 od. 31

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
112. Gelatina radice Salep. Rp. Pulv. radice salep 3iβ. Coque aquae font. suff. quantitate ut f. l. a. gelatina 3iv cui adde Succi citri recenter express. 3i. Sacchari albi 3β. M. DS. Theelöffelweis.	—	23

VI. Classe.

Linctus.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p style="text-align: center;">113. Linctus communis.</p> <p>Rp. Muellaginis gummi arabici Syrupi althaeae ana \mathfrak{zvi}. Aquae florum naphae $\mathfrak{z}\text{ i } \mathfrak{z}$. Misce. DS. Theelöffelweis.</p>	—	24
<p style="text-align: center;">114. Linctus emeticus comm.</p> <p>Rp. Tartari stibiati gri. Pulveris rad. ipecacuanhae $\mathfrak{z}\text{ i}$. Oxymellis squillae $\mathfrak{z}\text{ i } \mathfrak{z}$. Aquae destillatae $\mathfrak{z}\text{ i } \mathfrak{z}$. Misce ut fiat. l. a. linctus.</p> <p>DS. Umgeschüttelt, alle Viertel-Stunden einen starken Esslöffel voll zu nehmen, bis 2—3maliges Erbrechen erfolgt.</p>	—	14
<p style="text-align: center;">115. Linctus emeticus Hufelandi.</p> <p>Rp. Tartari stibiati grii. solve in Aquae destillatae $\mathfrak{z}\text{ ii}$. Pulv. rad. ipecacuanhae $\mathfrak{z}\text{ i}$. Oxymellis squillae $\mathfrak{z}\text{ i } \mathfrak{z}$. Misce exactissime ut fiat linctus.</p> <p>DS. Umgeschüttelt, alle $\frac{1}{4}$ Stunden 1 Esslöffel (Kinderu Theelöffel), bis Erbrechen folgt.</p>	—	15
<p style="text-align: center;">116. Linctus expectorans.</p> <p>Rp. Syrupi papaveris rhoeados $\mathfrak{z}\text{ ii}$. Oxymellis squillae $\mathfrak{z}\text{ i}$. Misce. DS. Stündlich einen Theelöffel voll zu nehmen.</p>	—	25

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>117. Linctus oleoso-gummosus. Rp. Olei amygdal. dulc. ℥iii. tere mucilaginis gummi arabici q. s. (pulv. gg. arab. 3i/3) ut fiat emulsio, cui admisce Syrupi papaveris albi 3/3. Aquae destillatae 3i/3. Misce. DS. Theelöffelweis zu gebrauchen.</p>	—	21
<p>118. Linctus opiat. Rp. Extracti opii aquosi gri. (in aq. solut.). Mucilaginis gg. arabici Syrupi violarum ana 3i. Misce. DS. Theelöffelweis zu nehmen.</p>	—	26
<p>119. Linctus stibiato-opiat. (Linctus de Laenec.) Rp. Tartari emetici gri/3. Extracti opii aquosi gr/3. solve in Mucilaginis gummi arabici Syrupi Violarum ana 3i. Misce. DS. 1/2—1 stündlich 1 Theelöffel bis 1 Esslöffel voll zu nehmen.</p>	—	26
<p>120. Linctus e Borace. (Litus oris) Rp. Boracis veneti pulv. 3i solve in Mellis rosarum 3i. DS. Pinselsaft.</p>	—	12

VII. Classe.

Guttulae.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>121. Guttulae acidulae.</p> <p>Rp. Acidi phosphorici diluti 3i. Aquae laurocerasi 3ii.</p> <p>MDS. Dreimal 15—20 Tropfen auf Zucker zu geben.</p>	—	14
<p>122. Guttulae ex acido hydrocyanico.</p> <p>(form. 1.)</p> <p>Rp. Acidi hydrocyanici gtt. x. Aquae cinnamomi spl. Spir. vini rectificatiss. ana gttss. Lx.</p> <p>M. Detur ad vitrum charta nigra obductum, epistomen vitreo bene clausum.</p> <p>Sign. Dreimal 5—8 Tropfen zu nehmen. (An einem kühlen Orte im Dunkeln aufzubewahren). (12 Tropfen enthalten 1 Tropfen Blausäure).</p>	—	7
<p>(form. 2.)</p> <p>Rp. Amygdalarum dulcium excorticat. 3ii. tere aq. font. q. s. ut fiat emulsio, in colat. 3i solve Amygdalini puri gr. xvii.</p> <p>MDS. Dreimal des Tags 5—15 Tropfen davon zu nehmen.</p>	—	25
<p>123. Guttulae antiarthriticae.</p> <p>(form. 1.)</p> <p>Rp. Vini seminis colchici 3i. Laudani liquid. Sydenh. 3i.</p> <p>MDS. Dreimal des Tags 20 Tropfen zu nehmen.</p>	—	24

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>form. 2).</p> <p>Rp. Vini seminis colchici $\frac{3}{\beta}$. " stibiati $\frac{3}{ii}$. Extract. aconiti $\frac{9}{\beta}$. Tincturae guajaci $\frac{3}{\beta}$. MDS. Dreimal 10 Tropfen zu nehmen.</p>	—	20
<p>(form. 3).</p> <p>Rp. Tincturae stramonii Vini antim. Huxhami ana $\frac{3}{ii}$. MDS. Dreimal täglich 5 Tropfen und damit steigend zu nehmen.</p>	—	12
<p>124. Guttulae antihaemorrhagicae.</p> <p>Rp. Laudani liquid. Sydenhami Elixirii acidi Halleri Tincturae cinnamomi ana $\frac{3}{\beta}$. MDS. 5—10—20 Tropfen auf Zucker p. d. zu nehmen.</p>	—	11
<p>125. Guttulae ex extracto Ferri pomati.</p> <p>Rp. Extracti ferri pomati $\frac{3}{ii}$. solve in Aquae cinnamom. spl. $\frac{3}{i\beta}$. Syrup. cinnamomi $\frac{3}{\beta}$. MDS. Theelöffelweis 3—4mal täglich.</p>	—	34
<p>126. Guttulae e Ferro jodato.</p> <p>Rp. Syrupi ferri jodati $\frac{3}{i}$. (3i cont. ferri jodat. grxv.) Aquae florum naphae $\frac{3}{i}$. Syrupi simpl. $\frac{3}{\beta}$. MDS. Zweimal des Tags einen Theelöffel voll.</p>	—	23

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
127. Guttulae e Ferro lactico. Rp. Ferri lactici \mathfrak{J} i — 3i. tere cum Aquae cinnamom. spl. 3ii. Syrup. sacchari 3ii. MDS. Dreimal täglich einen Theelöffel voll.	—	27—43
128. Guttulae e Morphio acetico. Rp. Morphii acetici gr. i. solve in Alcohol. vini gtts. v. Acidi acetici conc. gtt. i. Aquae destillatae 3i. MDS. 20 Tropfen auf Zucker zu nehmen.	—	12
129. Guttulae nervinae. Rp. Tincturae valerianae spl. „ castorei moscow. ana 3i. MDS.	1	6
130. Guttulae terebinthinatae. (contra Cholelithiasin) Rp. Aetheris sulfurici 3iiii. Olei terebinth. rectif. 3ii. MDS. Morgens und Abends 8 Tropfen zu nehmen.	—	17

VIII. Classe.

1) Emulsiones.

a) verae.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
131. Emulsio amygdalina pro mixtura. Rp. Amygdalarum dulcium $\text{}\overline{3}\text{vi}$. " amararum Nro. 3. Excorticat. contunde in mortario c. aq. font. q. s. ut fiat emulsio colaturae $\text{}\overline{3}\text{vi}$. adde Syrupi sacchari $\text{}\overline{3}\text{vi}$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	18
132. Emulsio amygdalina pro potu. Rp. Amygdalarum dulcium $\text{}\overline{3}\text{i}\beta$. " amararum Nro. 3. Excorticat. contunde in mortario c. aq. font. q. s. ut fiat emulsio colat. Mens. i. in qua dissolve Sacchari albi $\text{}\overline{3}\text{i}\beta$. DS. Tags über als Getränk zu gebrauchen.	—	26
133. Emulsio amygdalina arabica. Rp. Emulsionis amygdalinae $\text{}\overline{3}\text{vi}$. Mucilaginis Gummi arabici $\text{}\overline{3}\text{i}$. Syrupi simplicis $\text{}\overline{3}\beta$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen oder mit gleichen Theilen Wasser gemischt zum Getränk.	—	24
134. Emulsio amygdalina camphorata. Rp. Camphorae pulv. gri—grvi. Pulv. gg. arabici $\text{}\overline{3}\text{ii}$.		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
trituratione bene commisce et sensim sensim- que dissolve in Emulsionis amygdalinae spl. ℥vi . MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	22
135. Emulsio amygdalina chinata. Rp. Corticis chinæ reg. ℥ii — ℥℥ . fiat decoct. colat. ℥iv adde Emulsionis amygdalinae ℥vi . MDS. Stündlich 2 Löffel voll zu nehmen.	—	23—24
136. Emulsio amygdalina ferrata. (contra intoxicationem arsenicalem) Rp. Emulsionis amygdalinae ℥vi . cui admisce Ferri oxydati hydrati ℥℥ . Syrup. emulsivi ℥i℥ . MDS. Alle $\frac{1}{4}$ tel Stunden einen Esslöffel voll. —	—	45
137. Emulsio amygdalina opiata. Rp. Emulsionis amygdal. spl. ℥vi in qua dissolve Extracti opii aquosi gri. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	22
138. Emulsio amygdalina opiato-nitrosa. Rp. Nitri depurati ℥ii . Extracti opii aquosi gri solve in Emulsionis amygd. spl. ℥vi adde Syrup. papaveris albi ℥℥ . MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	29

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
139. Emulsio amygdalina salina. Rp. Tartari natronati $\text{℥}\beta - \text{℥}i$ solve in Emulsionis amygdal. $\text{℥}vi$ adde Syrupi mannat. $\text{℥}i\beta$. MDS. Stündlich 1—2 Löffel voll zu nehmen.	—	36—40
140. Emulsio seminis Cannabis $\text{℥}\beta - \text{℥}i$. „ „ Hyoscyami nigri $\text{℥}i - \text{℥}i$. „ „ Papaveris albi $\text{℥}i - \text{℥}vi$. parantur uti emulsio amygdalina. —		
b) Pseudo-Emulsiones.		
141. Mixtura oleoso-gummosa. Rp. Olei amygdalarum dulc. $\text{℥}iii$. Pulveris gg. arabici $\text{℥}i\beta$. bene terantur l. a. ut fiat aq. font. $\text{℥}v$ emulsio, cui adde Syrupi papaveris albi $\text{℥}\beta$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	20
142. Mixtura gummosa balsami peruviani. Rp. Balsami peruviani $\text{℥}i$. Pulv. gg. arabici $\text{℥}\beta$. bene terantur invicem ut fiat l. a. q. font. $\text{℥}vi$ emulsio, cui adde Syrupi balsami peruviani $\text{℥}i$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	26

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
143. Mixtura gummosa balsami Copaivae. Rp. Balsami copaivae $\mathfrak{z}\beta$. Pulv. gg. arabici $\mathfrak{z}\text{ii}$. bene terantur invicem, ut fiat l. a. aq. font. $\mathfrak{z}\text{vi}$ emulsio, cui adde Syrupi capillorum veneris $\mathfrak{z}\text{i}$. MDS. Stündlich 1 Löffel voll zu nehmen.	—	26
144. Mixtura terebinthinata. (Emuls. terebinth.) Rp. Terebinthinae venet. $\mathfrak{z}\text{i}$. Vitelli ovi Nro. 1 tere sensim addendo Aquae florum naphae $\mathfrak{z}\beta$. " destillat. $\mathfrak{z}\text{v}\beta$. ut fiat emulsio, cui adde Syrupi simpl. $\mathfrak{z}\text{i}$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	18

VIII. Classe. 2te Abtheil.

Decocta.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
145. Decoctum album. Rp. Rasurae cornu cervi Sacch. lactis pul. Oryzae sativ. contus. ana $\mathfrak{z}\text{i}$. Coq. aq. font. q. s. ut fiat colat. mens. 1 adde Succ. citri Syrup. „ ana $\mathfrak{z}\text{i}$. MDS. Tags über als Getränk zu verbrauchen.	—	58
146. Decoctum Althaeae cum Senega. Rp. Radicis polyg. senegae „ althaeae ana $\mathfrak{z}\text{i}\beta$. fiat aq. font. decoct. colat. $\mathfrak{z}\text{vi}$ adde Syrup. senegae $\mathfrak{z}\text{i}$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	23
147. Decoctum Chinae. Rp. Corticis chinae fuscae $\mathfrak{z}\beta$. Coq. aq. font. q. s. Colatur. $\mathfrak{z}\text{vi}$ adde Syrup. cort. aurant. $\mathfrak{z}\text{i}$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	33
148. Decoctum Colombo cum Salep. Rp. Radic. colombo $\mathfrak{z}\beta$ — $\mathfrak{z}\text{ii}$. „ salep. $\mathfrak{D}\beta$		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
fiat decoct. $\mathfrak{z}\text{v}$ adde Syrup. flor. naphae $\mathfrak{z}\text{i}$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	19—20
149. Decoctum Graminis cum Oxymelle. Rp. Radicis graminis $\mathfrak{z}\text{i}$. Cop. aq. font. q. s. colat $\mathfrak{z}\text{vi}$ adde Oxymellis simpl. $\mathfrak{z}\text{i}$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	20
150. Decoctum corticis radicis Granati. Rp. Cort. rad. granati recentis contus. $\mathfrak{z}\text{ii}$. Coque aq. font. mens. i/\mathfrak{z} ad colat. $\mathfrak{z}\text{xviii}$. D. ad vitrum. S. Früh nüchtern in $1\frac{1}{2}$ Stunde die ganze Portion zu trinken, — $\frac{1}{2}$ Stunde darnach Ol. Ricini $\mathfrak{z}\text{i}$ und nach der Wirkung noch $\mathfrak{z}\text{i}$ zu neh- men.	1	16
151. Decoctum Guajaci. Rp. Ligni guajaci raspat. $\mathfrak{z}\text{i}$. stet per horas duas in digest, tunc coq. aq. font. q. s. sub fin. coct. adde Rad. liquirit. conc. $\mathfrak{z}\text{ii}$. colat. Libr. i. DS. Tags über zu nehmen.	—	23
152. Decoctum Carragheen. Rp. Lichenis carragheen $\mathfrak{z}\text{i}$. coq. aq. f. q. s. colat. $\mathfrak{z}\text{vi}$ adde Syrup. althaeae $\mathfrak{z}\text{i}$. MDS. Stündlich einen Esslöffel voll zu nehmen.	—	18

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
153. Decoctum Lichenis islandici cum Salep. Rp. Lichenis islandici amaritie deliberati $\frac{3}{3}$. Radicis salep. $\frac{9}{3}$. coq. aq. font. colat. $\frac{3}{vi}$ adde Syrup. emulsiv. $\frac{3}{3}$. MDS. Stündlich 1 Esslöffel voll zu nehmen.	—	19
154. Decoctum Ratanhae. Rp. Radicis ratanhae concis. $\frac{3ii}{3}$. coq. aq. font. q. s. sub fin. coctionis adde corticis cassiae cinnamom. $\frac{3i}{3}$. colat. $\frac{3}{vi}$ adde Elixirii acid. Halleri $\frac{3i}{3}$. Syrup. rubi idaei $\frac{3i}{3}$. MDS.	—	32—34
155. Decoctum solvens. Rp. Radicis graminis „ taraxaci „ cichorei ana $\frac{3ii}{3}$. coq. aq. font. q. s. colat. $\frac{3}{vi}$ adde Syrup. rhei $\frac{3i}{3}$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	21
156. Decoctum Tamarindorum. Rp. Fructuum tamarindorum $\frac{3i}{3}$. coq. aq. font. q. s. colat. $\frac{3}{vi}$ adde Syrup. rubi idaei $\frac{3}{3}$ — $\frac{3i}{3}$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	20—23

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
157. Decoctum Tamarindorum cum Acido phosphorico. Rp. Decocti fruct. tamarind. \mathfrak{z}vi, (ex \mathfrak{z} i parat.) Acid. phosphorici diluti 3/3— \mathfrak{z} i. Syrup. rubi idaei \mathfrak{z} i. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	26—29

VIII. Classe. 3te Abtheil.

Infusa.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>158. Infusum Arnicae florum. Rp. Florum arnicae montanae 3ii infunde aquae font. suff. quantitate colat. 3vi adde Syrupi althaeae 3i. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.</p>	—	18
<p>159. Eodem modo parantur: Rp. Infus. rad. angelicae 3i—3ii. } " " caryophyllat. 3i—3ii. } 3vi " " calam. arom. 3i—3iii. } " " valerian. 3i—3iii.</p>		
<p>160. Infusum aromaticum acidum. Rp. Flavedinis aurantiorum 3ii inf. aq. font. fervid. q. s. colat. 3vi adde Tincturae aromat. acid. 3i—3ii (oder Elixirii acid. Halleri). Syrup. cort. cinnamom. 3i. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.</p>	—	27—29
<p>161. Infusum Chinae frigide paratum. Rp. Corticis chinae reg. contus. 3/3 infunde Aquae destillatae (s. vini generosi) q. s. saepius agitando macera per horas 36, fortiter</p>		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>expressae colaturae \mathfrak{zvi} adde Syrupi cort. cinnamomi \mathfrak{zi}. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.</p>	—	34—50
<p>162. Infusum Ipecacuanhae. Rp. Radicis ipecacuanhae gross. pulv. $\text{grv} - \text{grx}$ infunde aq. fervid. q. s. colat. \mathfrak{zv} adde Syrup. cort. aurantior. $\mathfrak{z\beta}$. MDS. Stündlich 1 Löffel voll zu nehmen.</p>	—	14
<p>163. Infusum Secale cornuti. Rp. Secale cornuti $\mathfrak{zii} - \mathfrak{z\beta}$ infunde aq. font. fervid. q. s. colat. \mathfrak{zvi} adde Syrupi althaeae \mathfrak{zi}. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.</p>	—	22—28
<p>164. Infusum Sennae compositum. (seu aqua laxativa viennensis). Rp. Foliorum sennae Mannae electae ana \mathfrak{zvi}. infunde aq. ferv. q. s. ad colat. \mathfrak{zvi} in qua dissolve Tartari natronati \mathfrak{zvi}. MDS. Halbtassenweis zu nehmen.</p>	—	36
<p>165. Potio laxans. e senna. Rp. Aquae laxativae viennensis $\mathfrak{zii}/\mathfrak{z}$. „ cerasorum nigrorum \mathfrak{zi}. Tartari natronati \mathfrak{ziiii}. Syrupi mannati \mathfrak{zi}. MDS. Halbstündlich einen Löffel voll zu nehmen.</p>	—	36

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p style="text-align: center;">Decocto-Infusa.</p> <p>166. Infusum Uvae Ursi cum Thea.</p> <p>Rp. Foliorum uvae ursi $\frac{3}{\beta}$. coq. aq. font. q. s. per horam dimid. tunc infunde Theae boheae $\frac{3}{i}$. colat. $\frac{3}{vi}$ adde Syrup. capillorum veneris $\frac{3}{i}$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.</p>	—	25

VIII. Classe. 4te Abtheil.

Mixturen und Solutiones.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>167. Mixtura antihydrica Frankii.</p> <p>Rp. Gummi resinae ammoniaci ℥ii tere c. Liquor. kali acetici ℥ii. Aquaе petroselinii „ juniperi ana ℥iii. adde Extracti rad. squillae grv. Aetheris acetici grx. Syrupi cort. cinnamomi ℥i.</p> <p>MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.</p>	—	33
<p>168. Mixtura chlorata.</p> <p>Rp. Aquaе chloratae ℥i. „ destillatae ℥iv. Syrupi simplicis ℥℔.</p> <p>MD. ad vitrum charta nigra obtectum.</p> <p>S. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.</p>	—	15
<p>169. Mixtura diaphoretica.</p> <p>Rp. Liquoris ammon. acetici ℥℔ — ℥i. Aquaе melissae ℥iv. Roob sambuci Syrupi althaeae ana ℥i.</p> <p>MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.</p>	—	33—40

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
170. Mixtura Rhei composita. Rp. Extracti cardui benedicti 3/3 solve in Aquae menthae crispae Tincturae rhei vinosae ana 3i/3. MDS. 2—3mal des Tags 1 Löffel voll zu nehmen.	—	35
171. Mixtura Rhei salina. Rp. Natri sulfurici 3/3 solve in Aquae destillatae 3iv. ,, foeniculi 3ii. adde Tincturae rhei aquosae 3/3. Succi liquiritiae dp. 3ii. MDS. Morgens stündlich eine halbe Tasse voll zu nehmen.	—	21
172. Mixtura Riveri. (potio Riveri.) Rp. Kali carbonici depurati 3/3 satura c. Succi citri recenter expressi q. s. (3x). (Aceti vini q. s. (3i) adde Aquae destillatae 3iii. Syrupi simplicis 3/3. MDS. Stündlich 1 Löffel voll zu nehmen.	— —	22 16
173. Mixtura salina. Rp. Magnesiae sulfuricae 3i solve in Aquae fontanae 3iv.		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Aquae foeniculi $\mathfrak{z}\text{ii}$. Succu liquiritiae $\mathfrak{z}\text{ii}$. MDS. Morgens nüchtern halbtassenweis zu nehmen.	—	18
174. Mixtura salina cum oleo Crotonis. Rp. Olei crotonis tigl. gtt. i—ii tere cum Sacchari albi Magnesiae sulfuricae ana $\mathfrak{z}\beta$ — i. solve in Decocti graminis $\mathfrak{z}\text{vi}$. MDS. Stündlich 1 Löffel voll.	—	18—20
175. Solutio Ammonii phosphorici. Rp. Ammonii phosphorici $\mathfrak{z}\text{i}$ solve in Aquae destillatae $\mathfrak{z}\text{v}$. adde Syrupi rubi idaei $\mathfrak{z}\beta$. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	21
176. Solutio Ferri sulfurici. (solut. antihæmorrhag.) Rp. Ferri sulfurici oxydulati $\mathfrak{z}\beta$ solve in Aquae florum naphae $\mathfrak{z}\text{iii}$. adde Syrupi cort. cinnamom. $\mathfrak{z}\text{i}\beta$. „ cerasorum $\mathfrak{z}\beta$. MDS. Stündlich 1 Löffel voll zu nehmen.	—	53

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>177. Solutio Chinini sulfurici.</p> <p>Rp. Chinini sulfurici $\mathfrak{D}\beta$ solve in Acidi sulfurici diluti \mathfrak{grv}. Aquae destillatae $\mathfrak{z}\text{iv}$. adde Syrupi cort. cinnamomi $\mathfrak{z}\text{i}$.</p> <p>MDS. Stündlich einen Kaffeelöffel voll zu nehmen.</p>	—	35
<p>178. Solutio gummosa.</p> <p>Rp. Mucilaginis gummi arabici $\mathfrak{z}\text{i}$. Aquae cerasorum nigrorum $\mathfrak{z}\text{v}$. Syrupi papaveris albi $\mathfrak{z}\text{vi}$.</p> <p>MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.</p>	—	19
<p>179. Solutio gummosa camphorata. (Aura camphorata.)</p> <p>Rp. Camphorae pulv. gri—grii tere cum Mucilaginis gummi arabici $\mathfrak{z}\text{lii}$. Aquae florum aurantii $\mathfrak{z}\text{lii}$. Syrupi papaveris albi $\mathfrak{z}\text{i}$.</p> <p>MDS. Stündlich $\frac{1}{2}$—1 Löffel voll zu nehmen.</p>	—	39
<p>180. Solutio Kali hydrojodinici. (resp. Kalii jodati.)</p> <p>Rp. Kali hydrojodinici $\mathfrak{D}\text{i}$—$\mathfrak{z}\text{i}$ solve in Aquae destillatae $\mathfrak{z}\text{v}$. Syrupi simplicis $\mathfrak{z}\beta$.</p> <p>MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.</p>	—	19—31

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
181. Solutio nitrosa. Rp. Kali nitrici depurati 3ii—3j solve in Decocti althaeae conc. 3vi e 3vi parat. adde Succi liquiritiae dep. 3ii. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	17—19
182. Solutio Tartari emetici in refracta dosi. Rp. Decocti tamarindinati 3vi. Tartari stibiati gri. Syrupi rubi idaei 3i. MDS. Stündlich 1 Löffel voll zu nehmen.	—	20
183. Solutio Tartari emetici in plena dosi. Rp. Tartari stibiati grx solve in Aqua destillatae 3v. Succi liquiritiae dep. 3i. MDS. Stündlich einen Löffel voll zu nehmen.	—	14

IX. Classe.

Sera medicata.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>184. Serum Lactis acetosum.</p> <p>Rp. Lactis vaccin. Ms.i coque et in momento ebullitionis adde Aceti vini optimi q. s. (3iij.) ad coagulationem, tunc cola et serum satura pulvere concharum ppt. q. s. adde Syrupi simplicis $\text{ʒi}\beta$.</p> <p>DS. Essigmolke.</p>	—	sine vitro 24
<p> 185. Serum Lactis tartarisatum edulcoratum.</p> <p>Rp. Lactis vaccin. Mens.i coque et sub initio ebullitionis adde Tartari depurati ʒii. coagulatione peracta liquorem semirefrigeratum cola et satura c. Conch. ppt. q. s. ad neutralisat. tunc iterum cola et adde Syrupi simplicis $\text{ʒi}\beta$.</p> <p>DS. Weinsteinmolke.</p>	—	s. v. 24
<p>186. Serum Lactis aluminatum.</p> <p>Uti serum lactis tartarisatum edulcoratum. Loco tartari depurati ʒii</p> <p>Rp. Aluminis pulverisati ʒi.</p> <p>DS. Alaunmolke.</p>	—	s. v. 23

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
187. Serum Lactis tamarindinatum. Rp. Lactis vaccin. Mens.i coque et inter ebullitionem adde Fructuum tamarindorum $\frac{3}{4}$. cola et adde Syrupi simplicis $\frac{3}{4}$. DS. Tamarindenmolke.	—	s. v. 28
188. Serum Lactis gramineum. Rp. Radicis graminis concis. Sacchari lactis ana $\frac{3}{4}$. coque c. aquae fontanae q. s. ut fiat colatura $\frac{3}{4}$ vi pro mixtura. Mens. $\frac{3}{4}$ pro potu.	—	s. v. 14—15
189. Serum Lactis herbaceum. Rp. Lactis vaccin. Mens.i coque et sub initio ebullitionis adde Succi herbarum recenter expressi $\frac{3}{4}$ vi. (Leontod. tarax. — Chelid. majus. — Nasturt. aquat. — Rumex acetos. — Asperula odorata. — Plantago — etc.) — Fructuum tamarindorum $\frac{3}{4}$. coagulatione peracta liquorem cola et adde Syrupi simplicis $\frac{3}{4}$. DS. Kräutermolke.	—	s. v. 36

X. Classe.

Gargarismata.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p style="text-align: center;">190. Gargarisma chlorata.</p> <p>Rp. Decocti althaeae ten. ex ℥iii parati ℥viii adde Aquae chloratae ℥ii.</p> <p>MDS. Zum Gurgeln.</p>	—	24
<p style="text-align: center;">191. Gargarisma e Cicuta.</p> <p>Rp. Herbae cicutae virosae ex $\text{℥}\beta$ — ℥i parati ℥xii adde Mellis despumati ℥i.</p> <p>MDS. Zum Gurgeln. (Argenti nitrici crystallisati grii — grv.)</p>	—	22—25
<p style="text-align: center;">192. Gargarisma emolliens.</p> <p>Rp. Decocti althaeae ten. ℥xii. Mellis despumati $\text{℥i}\beta$.</p> <p>MDS. Zum Gurgeln.</p>	—	21
<p style="text-align: center;">193. Gargarisma ex herba Cochleariae.</p> <p>Rp Infusi herbae cochleariae ex $\text{℥}\beta$ — ℥i parati ℥x. adde Tincturae myrrhae ℥i. Mellis rosarum ℥i.</p> <p>MDS. Zum Gurgeln.</p>	—	21—23

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>194. Gargarisma ex herba Salviae. (Gargarisma adstringens.)</p> <p>Rp. Herbae salviae $\mathfrak{z}\text{i}$ infunde aquae fervidae quantit. suff. colat. $\mathfrak{z}\text{vi}$ adde Boracis veneti $\mathfrak{z}\text{i}$. Mellis rosarum $\mathfrak{z}\text{i}$.</p> <p>MDS. Zum Gargeln.</p>	—	21

XI. Classe.

Clysmata.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>195. Clysma commune.</p> <p>Rp. Infusi florum chamomillae ex $\frac{3}{3}$ parati $\frac{3}{4}$ solve Natri mercuriati $\frac{3}{3}$. Olei lini $\frac{3}{4}$. M. fiat clysma. DS. Klystier.</p>	—	18
<p>196. Clysma eccoproticum.</p> <p>Rp. Decocti seminum lini ex $\frac{3}{3}$ parati $\frac{3}{4}$ adde Magnesiae sulfuricae Olei ricini ana $\frac{3}{4}$. M. fiat clysma. DS. Klystier. (Die Wirkung kann noch erhöht werden durch Zusatz von olei crotonis tigllii gttii—gttiii.)</p>	—	27
<p>197. Clysma emolliens.</p> <p>Rp. Decocti seminis lini ex $\frac{3}{3}$ parati $\frac{3}{4}$ adde Olei lini $\frac{3}{4}$. MDS. Klystier.</p>	—	14
<p>198. Clysma ex Aceto Vini.</p> <p>Rp. Furfuris tritici $\frac{3}{4}$ coque aquae fontanae q. suff. colat. $\frac{3}{4}$.</p>		

Formeln.		Taxe.	
		fl.	kr.
adde Aceti vini $\text{ʒii} - \text{ʒiii}$. MDS. Klystier.		—	12—13
199. Clyisma ex Asa foetida. Rp. Gummi resinae asae foetidae ʒi tere cum Vitelli ovi Nr. 1 et subige Infusi radices valerianae e ʒi/3 parati ʒvi . MDS. Klystier.		—	16
200. Clyisma ex herba Nicotianae Tabaci. Rp. Foliorum nicotianae tabaci ʒ3 infunde aquae fervidae q. s. colat. ʒvi . MDS. Zum Klystier.		—	8
201. Clyisma ex Oleo Terebinthinae. Rp. Olei terebinthinae $\text{ʒ3} - \text{ʒii}$ tere cum Vitelli ovi Nr. 1 et subige Decocti althaeae ʒv . MDS. Klystier.		—	14
202. Clyisma ex Opio. Rp. Decocti caput papaveris albi e ʒi parati ʒv adde Laudani liquidi Sydenhami gttv — gttviii. MDS. Klystier.		—	18—19

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
203. Clyisma e Tartaro emetico. Rp. Tartari emetici grii—griv solve in Aquae destillatae ℥vi. DS. Zum Klystier.	—	9
204. Clyisma viscerale Kaempfli. Rp. Radicis graminis „ taraxaci „ saponariae Herbae cardui benedicti ana ℥ii coque aquae fontanae quant. suff. ad colaturam ℥vi in quibus solve Saponis veneti ℥ii. MDS. Zum Klystier,	—	17

II. Hauptabtheilung.

FORMELN ZUM ÄUSSERN GEBRAUCH.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS
530 N. Dearborn Ave. Chicago, Ill. 60610-5080
Tel: (773) 936-3400 Fax: (773) 936-3401

I. Abtheilung.

I. Species.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>1. Species aromaticae.</p> <p>Rp. Herbae majoranae „ rorismarini „ serpylli „ thymi Florum lavandulae ana ℥vi. Caryophyllorum aromatic. ℥lii. Concia. contus. m. f. species.</p> <p>Im Aufguss zu Fomentationen, zu feuchten und trocknen aromatischen Umschlägen, zu Bädern u. s. f.</p>	℥i	6
<p>2. Species emollientes herbaceae.</p> <p>Rp. Herbae malvae „ althaeae „ farfarae ana ℥i. Farinae seminis lini ℥ii. M. f. species.</p> <p>Als feuchte und trockne Ueberschläge, in Bädern u. s. f.</p>	℥i ℥i	36 4
<p>3. Species emollientes pulv.</p> <p>Rp. Farfuris tritici ℥iii. Farinae seminis lini ℥i. M. f. species. Zu Umschlägen.</p>		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>4. Species narcoticae.</p> <p>Rp. Herbae hyoscyami „ cicutae „ belladonnae ana partes aequales. Misce f. species. Zu Cataplasmen, Fomentationen.</p>	3i	4
<p>5. Species sopientes.</p> <p>Rp. Farinae seminis lini „ cannabisi „ ana $\mathfrak{z}\text{i}$/β. Herbae cicutae „ hyoscyami ana $\mathfrak{z}\text{i}$. Misce f. species. Zu Cataplasmen, Fomentationen.</p>	$\mathfrak{z}\text{i}$	48
<p>6. Lana aromatica.</p> <p>Rp. Camphorae tritae 3vi. solve in Alcoholis 3ii. adde Balsami peruviani Olei de cedro ana 3i. Mixturae oleoso-balsamicae 3ii. Liquoris ammonii caustici $\mathfrak{z}\beta$. MD. Mit dieser Flüssigkeit wird ein Stück Leinwand getränkt, welches sodann in baumwollene Watte gerollt und 24 Stunden lang in einem gut verschlossenen Gefässe aufbewahrt wird.</p>		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
II. Fomentationes (et Fumigationes).		
7. Fomentatio Calcariae chloratae.		
Rp. Calcariae chloratae \mathfrak{z} ii. tere cum Infusi florum chamomillae ex \mathfrak{z} i/3 parati \mathfrak{z} i/3. Detur ad vitrum. Zu Umschlägen.	—	26
8. Fomentatio chlorata.		
Rp. Aquae chloratae \mathfrak{z} iii. Infusi chamomillae ex \mathfrak{z} i parati \mathfrak{z} xii. Detur ad vitrum. Wie oben.	—	30
9. Fomentatio frigida Schmuckeri.		
Rp. Nitri crudi \mathfrak{z} ii. Salis ammoniaci venalis \mathfrak{z} i. solve in Aquae fontanae frigidae \mathfrak{z} iv. Aceti communis \mathfrak{z} i. MD. Compressen damit zu befeuchten und kalt über- zuschlagen.	\mathfrak{z} i	6
10. Fomentatio Heisteri.		
Rp. Lithargyri praeparati \mathfrak{z} vi. Boli armenae \mathfrak{z} i. Resinae masticis Gg. resin. myrrhae ana \mathfrak{z} /3. Coque cum aceti vini \mathfrak{z} i per horam dimidiam. D. Compressen damit zu befeuchten und lauwarm über- zuschlagen.	1	4

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
11. Aqua Goulardi. (Aqua vegeto-mineralis Goulardi) Rp. Liquoris plumbi acetici $\frac{3}{3}$. Spiritus vini rectificati $\frac{3}{ii}$. Aquae fontanae $\frac{3}{ii}$. MD. Zum äusserlichen Gebrauch.	—	15
12. Aqua phagadaenica fortior. Rp. Mercurii sublimati corrosivi grxviii. solve in Aquae calcis $\frac{3}{xii}$. Detur ad vitrum. Zu Umschlägen entweder für sich oder mit Wasser verdünnt.	—	13
13. Aqua phagadaenica nigra (mitis). Rp. Calomel grxvi. Solve in Aquae calcis $\frac{3}{iv}$. DS. Wie das vorige.	—	10
14. Aqua vulneraria Thedenii. Rp. Acidi sulfurici diluti $\frac{3}{iii}$. Spiritus vini rectificati $\frac{3}{ix}$. Mellis despumati $\frac{3}{vi}$. Aceti crudi $\frac{3}{xviii}$. Misce et filtra. — Zu Umschlägen.	$\frac{3}{i}$ $\frac{3}{i}$	36 4
15. Decoctum Fuliginis. Rp. Fuliginis splendentis manp. II. coque c. suff. quantitat. aquae font. per $\frac{3}{4}$ horam ad remanen- tiam $\frac{3}{iii}$. Cola. DS. In Form lauer Bähungen umzuschlagen.		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>16. Fumigatio Chlori.</p> <p>I.</p> <p>Rp. Natri muriatici ℥iii. Mangani hyperoxydati nigri ℥i. Acidi sulfurici concentrati dilat. c. Aquae communis ana ℥i.</p> <p>II.</p> <p>Rp. Calcariae chloratae ℥iii. infunde Acid. sulfuric. dilat. q. s. ad producend. gas chloricum.</p>		
<p>III. Caustica.</p> <p>17. Liquor Bellostii.</p> <p>Rp. Hydrargyri nitrici oxydati ℥i. solve in Aquae destillatae ℥i. adde Acidi nitrici diluti gtt. iv.</p> <p>MD. Zum Betupfen.</p>	—	10
<p>18. Pulvis causticus Cosmi.</p> <p>Rp. Arsenici albi pulv. ℥ii. Cinerum solear. gr xii. Sanguinis draconis gr xv. Cinnabaris artificialis ℥ii.</p> <p>Misce exactissime, fiat pulvis.</p> <p>DS. Mit Wasser zu einer Paste anzumachen, und nachdem sie aufgetragen, mit Spinnweben zu bedecken.</p>	—	13

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
IV. Linimenta.		
19. Linimentum Calcis.		
Rp. Olei lini $\mathfrak{z}\text{i}/\beta$. sensim sensimque admisce Aquaе Calcis $\mathfrak{z}\text{iii}$, ut fiat linimentum.	—	12
DS. Auf gefensterete Leinwand gestrichen aufzulegen.		
20. Linimentum phosphoratum.		
(Oleum phosphoratum.) Rp. Phosphori in lamell. concis. gr vi. solve in leni calore in Olei amygdalarum dulc. $\mathfrak{z}\text{ii}$. Solutione peracta adde Olei hyoscyami cocti $\mathfrak{z}\text{i}$.	—	31
MD. Phosphorliniment.		
21. Linimentum phosphoratum camphoratum.		
Linimento phosphorato adde Camphorae tritae $\mathfrak{z}\text{i}$. D.	—	34
22. Linimentum volatile.		
Rp. Liquoris Ammonii caustici $\mathfrak{z}\text{ii}$. Olei papaveris albi $\mathfrak{z}\text{vi}$. M. fiat linimentum.	—	12
23. Linimentum volatile camphoratum.		
Rp. Liquoris ammonii caustici $\mathfrak{z}\text{ii}$. Olei camphorati $\mathfrak{z}\text{vi}$. M. fiat linimentum.	—	18

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
V. Unguenta.		
24. Ceratum simplex. Rp. Cerae albae part. i. Axung. porci partes iv. Colliquat. et semirefrigerat. detur ad ollam. Auf Leinwand gestrichen aufzulegen.	3i	10
25. Ceratum opiatum. Rp. Cerati simplicis 3i. Tincturae Opii simplicis 3i. Misce. D. ad ollam. Wie beim vorigen.	—	19
26. Ceratum Saturni. (Ceratum plumbicum.) Rp. Axung. porci 3xviii. Cerae albae 3ivβ. leni calore colliquatis paullatim admisce Aceti plumbici 3i et 3vii. Aquaе destillatae 3ivβ. commixtis. Sera. Auf Leinwand gestrichen aufzulegen.	3i	8
27. Unguentum ad perniones. Rp. Ammonii carbonici pyrooleosi 3ii. Balsami peruviani nigri 3i. Camphorae tritae 3ii. Croci sativi pulv. 3i. Unguenti althaeae 3ii. Misce exactissime ut fiat unguentum. Zum Einreiben.	—	51

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
28. Unguentum anodynum. Rp. Camphorae tritae \mathfrak{J} i. Tincturae Opii crocatae \mathfrak{J} i. Unguenti althaeae \mathfrak{J} i. Misce fiat unguentum. Zum Einreiben.	—	21
29. Unguentum de Ferrear. Rp. Camphorae tritae $\mathfrak{J}\beta$. Saponis medicati \mathfrak{J} ii. Unguenti basiliconis \mathfrak{J} i. Misce fiat unguentum. Zum Einreiben.	—	22
30. Unguentum emolliens. I. Rp. Unguenti althaeae „ mercurialis ana \mathfrak{J} iii. Olei hyoscyami cocti \mathfrak{J} ii. Misce fiat ungt. Zum Einreiben. II. Rp. Unguenti mercurialis Olei hyoscyami cocti ana $\mathfrak{J}\beta$. Misce fiat ungt. Zum Einreiben.	—	17
31. Unguentum emolliens camphoratum. (Unguentum ad mammas.) Rp. Camphorae pulv. \mathfrak{J} i. Cerae albae $\mathfrak{J}\beta$. Spermaceti \mathfrak{J} i. Olei amygdalarum dulcium \mathfrak{J} i β . Misce fiat lege artis ungt. Zum Einreiben.	—	24

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
32. Unguentum Haenii. (contra decubitus) Rp. Albuminis ovi Nr. 1. Spiritus vini rectificati $\text{ʒi}/\beta$. Misce terendo ut fiat linimentum. Auf Leinwand gestrichen aufzulegen.	—	11
33. Unguentum Kali hydrojodinici. Rp. Kali hydrojodinici ʒi . Magnesiae albae gr vi. Axungiae porci ʒi . (Unguenti rosati ʒi .) Misce fiat ungt. Zum Einreiben.	—	31—35
34. Unguentum Kali hydrojodinici cum Jodo puro. Rp. Jodi puri gr iiii—v. Kali hydrojodinici 3β — ʒi . Axungae porci ʒi . Misce fiat unguentum. Zum Einreiben.	—	21—31
35. Unguentum nervinum. Rp. Camphorae ʒii in Olei baccarum juniperi ʒi . solutae adde Olei laurini $\text{ʒii}/\beta$. Sevi ovilli ʒii . Misce fiat unguentum. Zum Einreiben.	—	38

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
36. Unguentum Plumbi tannici Autenriethii. (Unguentum Autenriethii contro decubitus.) Rp. Corticis quercus concis ℥ii. Coque cum aquae fontanae quant. soff. ad colatur. ℥viii. adde Liquoris plumbi acetici, quamdiu praecipitatum oria- tur, (℥ii) quod in colatorium charta emporetica tectum impositum aqua comm. sedulo elotum in tantum siccetur, ut pulvem unguinosam praebet, quae loco frigido ser- vanda est. (℥iii.) Auf Leinwand gestrichen aufzulegen.	—	27
37. Unguentum Plumbi tannici Weikardii. (contra decubitus.) Rp. Plumbi tannici sicci ℥i. tere cum aqua font. et admisce Axung. porci ℥i. Detur ad ollam. — Auf Leinwand gestrichen aufzulegen.	—	12
38. Unguentum Tartari emetici. (Unguentum Autenriethii.) Rp. Tartari emetici subtilissime pulv. ℥ii. Axung. Porci ℥i. Misce fiat unguentum. D. ad ollam. — Bis zum Erscheinen von Pusteln täglich 2—3 mal da- mit einzureiben.	—	21

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
VI. Emlastra.		
39. Emplastrum adhaesivum. Rp. Lithargyri subtilissime-pulverisati ʒx. coque cum Olei Olivarum ord. ʒxviii. ut fiat lege artis emplastrum cui adde Picis burgundicae. Colophonii albi ana ʒxxviii. Colliquat. in patinam effunde. Serva. Heftpflaster.	ʒi	6
40. Emplastrum ad perniones. Rp. Opii puri pulverisati ʒi. Balsami peruviani ʒii. Emplastri lithargyri simpl. ʒiii. Misce fiat lege artis emplastrum. Auf Schaffleder gestrichen aufzulegen.	—	20
41. Emplastrum aromaticum. (Empl. stomachicum). Rp. Cerae flavae ʒii. Sevi ovilli ʒi/3. Terebinthinae communis ʒ3. Liquatis et semirefrigeratis admisce Pulveris resinae olibani ʒi. „ „ benzoes ʒvi.		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Olei nucistae 3ii. „ anthos „ caryophyllorum ana 3i. Misce fiat lege artis emplastrum. Auf Leder gestrichen aufzulegen.</p>	3i	24
<p>42. Emplastrum emolliens. Rp. Emplastri mercurialis „ meliloti „ cicutae „ hyoscyami ana pts. aeq. Misce fiat emplastrum. Auf Leder oder Leinwand gestrichen aufzulegen.</p>	3i	12
<p>43. Emplastrum rubefaciens. Rp. Emplastri Galbani crocati 3v. „ vesicatorii ordin. 3iii. Misce fiat empl. Auf Leder gestrichen aufzulegen.</p>	—	20
<p>44. Emplastrum stibiatum. Rp. Tartari emetici 3ii. Emplastri citrini 3i. Misce fiat emplastrum. Auf Leder gestrichen aufzulegen. Anmerkung. Die übrigen hier nicht aufgeführten officinellen Salben und Pflaster werden am zweckmässig- sten nach der preussischen Pharmacopoe bereitet.</p>	—	24

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
VII. Balnea.		
I. Balnea cum Sapone domestico.		
pro Nr. 1. Saponis domestici $\text{℥iii} - \text{℥vi}$.	—	—
Zubereitung. Die Seife wird fein geschabt und in einer gewöhnlichen Schüssel mit etwas warmem Wasser zu Schaum geschlagen und hierauf dem Badwasser zugesetzt.		
II. Balnea cum Furfure tritici.		
pro Nr. 1. Furfuris tritici $\text{℥vi} - \text{℥xii}$.	—	—
Zubereitung. Die Kleie wird $\frac{1}{4}$ tel Stunde vor dem Eintritt ins Bad mit etwas heissem Wasser angebrüht, in ein Tuch eingeschlagen und so in das Badwasser eingehängt. —		
III. Balnea cum Maltho hordei.		
pro Nr. 1. Malthi hordei $\text{℥vi} - \text{℥xxiv}$.	—	—
Zubereitung. Das grüßlich zerstoßene Malz wird ebenso wie die Kleie behandelt.		
IV. Balnea cum Glutine animalis.		
pro Nr. 1. Glutinis animalis $\text{℥iii} - \text{℥ix}$.	—	—
Zubereitung. Der käufliche Leim wird vorerst durch Kochen mit Wasser gelöst und in gelöstem noch heissem Zustande dem warmen Badwasser zugesetzt.		
V. Balnea salina.		
a) Balnea cum Natro muriatico.		
pro Nr. 1. Natri muriatici $1\text{℥} - \text{v℥}$ p. med.	—	—
Zubereitung. Das gewöhnliche Kochsalz kann wegen seiner leichten Löslichkeit kurz vor dem Gebrauche dem Badwasser erst zugeschüttet werden.		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
b) Balnea cum Sale de Orb. (eingedickte Mutterlauge.) pro Nr. 1. Salis de Orb \mathfrak{xi} — \mathfrak{xv} p. med. Zubereitung. Die eingedickte Orber Mutterlauge (gewöhnlich Orber Salz genannt) wird dem Bade kurz vor dem Gebrauche erst zugesetzt,	—	4—20
c) Balnea cum Sale de Creuznach. (eingedickte Mutterlauge.) pro Nr. 1. Salis de Creuznach \mathfrak{xi} — \mathfrak{xiii} p. med. Zubereitung. Wie beim Orber Salze.	—	8—24
d) Balnea cum Sale marino. pro Nr. 1. Salis marini \mathfrak{xi} — \mathfrak{xii} p. med. Zubereitung. Wie beim Orber Salze.	—	10—20
VI. Balnea marina artificial. sec. Hufeland. Rp. Natri muriatic. \mathfrak{xi} p. m. Kali carbonici crudi \mathfrak{zvi} . solve in aquae fontanae $\mathfrak{xlv}\mathfrak{3}$ p. m. et adde Saponis veneti \mathfrak{xi} . Olei terebinthinae $\mathfrak{z}\mathfrak{3}$. Tincturae benzoës \mathfrak{ziii} . Misce. Zubereitung. Die schon zubereitete Mischung wird kurz vor dem Gebrauche dem Badwasser erst zugesetzt. —	—	18
VII. Balnea sulfurata. a) Balnea sulfurata alcalina. pro Nr. 1. Hepatis sulfuris alcalini \mathfrak{zii} — \mathfrak{ziii} .	—	24—28

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
b) Balnea sulfurata calcarea. pro Nr. 1. Hepatis sulfuris calcarei ʒii — ʒiii . Zubereitung. Die verordnete Menge Schwefelleber wird kurz vor dem Gebrauche dem Badwasser erst zugesetzt.	—	16—12
c) Bareges-Bäder. Hepatis sulfuris calcarei part. viii. Natri muriatici part iv. Extr. saponar. Glutinis animalis ana part. i. Von dieser Mischung werden Kugeln zu $1\frac{1}{2}$ ʒ Gewicht verfertigt, und 1—2 Stück kurz vor dem Gebrauche dem Badwasser zugesetzt.		
VIII. Balnea jodata. pro Nr. 1. Rp. Jodi puri ʒi . Kali hydrojodini ʒii . solve in Aquae fontanae ʒvi . Diese Mischung wird dem Badwasser ebenfalls kurz vor dem Gebrauche erst zugesetzt.	1	8
IX. Balnea cum Mercurio sublimato corrosivo. pro Nr. I. Mercurii sublimati corrosivi ʒi — ʒi — ʒii . Zubereitung. Der etwas fein zerriebene Sublimat wird in ein zu diesem Zweck stets bereit zu haltendes Gefäß geworfen, mit heissem Wasser gelöst und so dem Badwasser zugesetzt.	4—30 —1 fl.	
X. Balnea ferrata. a) pro Nr. 1. Globulorum martialium Nr. 1—3.	—	21—36

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
b) pro Nr. 1. Ferri sulfurici crudi $\text{℥ii} - \text{℥iv}$. Zubereitung. Sowohl die Stahlkugeln wie der Eisenvitriol werden im zerkleinerten Zustande dem Badwasser blos zugesetzt. —	—	6—30
XI. Balnea cum Acidis. a) pro Nr. 1. Aquae regis $\text{℥i} \beta - \text{℥iii}$. b) pro Nr. 1. Acidi nitrici conc. $\text{℥i} \beta - \text{℥iii}$. Sind blos dem Badwasser zuzugiesen.	— —	12—24 18—36
XII. Balnea cum Kali caustico. pr. Nr. 1. Kali caustici $\text{℥} \beta - \text{℥ii}$. Ist wegen seiner leichten Löslichkeit blos dem Badwasser zuzusetzen.	—	10—40
XIII. Balnea adstringentia. pro Nr. 1. Corticis quercus seu corticis coriarii $\text{℥vi} - \text{℥ii}$ p. med. Zubereitung. Die Eichenrinde oder Lohe wird mit einigen Maas heissen Wassers übergossen, in ein Tuch eingeschlagen und sowohl die ablaufende Flüssigkeit als auch die in das Tuch eingeschlagene Lohe oder Eichenrinde dem Badwasser zugesetzt.	—	—
XIV. Balnea aromatica. pro Nr. 1. Specierum aromaticarum $\text{℥vi} - \text{℥xii}$. Zubereitung. Die aromatischen Kräuter werden ganz leicht in ein Tuch eingeschlagen und in das Bad 5—10		30— 1 fl.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Minuten vorher eingehängt oder dieselben werden auf einen Seier gebracht und mit dem heissen Wasser übergossen.		
<p>XV. Balnea narcotica.</p> <p>pro Nr. 1. Specierum narcoticarum $\text{ʒiii} - \text{ʒvi}$.</p> <p>Die Zubereitung ist dieselbe wie bei den aromatischen Kräutern.</p>	—	12—30

II. Abtheilung.

Formeln der ophthalmiatischen Klinik.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>VIII. Collyria.</p> <p>Aqua Conradi.</p> <p>(Aqua ophthalmica Conradi.)</p> <p>Rp. Hydrargyri muriatici corrosivi gr β—gr i solve in Aquae rosarum ζiv. adde Mucilaginis seminum cydoniorum ζi. Laudani liquidi Sydenhami 3β—\mathfrak{g}ii. Misce fiat collyrium.</p> <p>DS. Augenwasser.</p>	—	15—16
<p>Aqua coerulea.</p> <p>(Aqua sapphyrina, coelestis.)</p> <p>Rp. Aeruginis gr iiii—gr vi solve in Aquae destillatae ζiii. solutioni adde Liquoris ammonii caustici gtts vi—vii.</p>	—	8—9
<p>Collyrium ophthalmicum.</p> <p>(e lapide divino.)</p> <p>Rp. Lapidis divini St. Yvesii gr iv solve in</p>		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Aquae rosarum ʒiv. adde Laudani liquidi Sydenhami $\text{ʒʒ}-3\text{ʒ}$. Misce fiat collyrium. DS. Augewasser.</p>		
<p>NB. Praeparatio lapidis divini St. Yvesii. Rp. Cupri sulfurici Kali nitrici Aluminis crudi ana ʒii. pulverisat. misce, et in balneo arenae in vase vitreo liquefactis et semirefrigeratis admisce Camphorae tritae ʒi.</p>	ʒi	16
<p>Collyrium cum liquore Bati. Rp. Liquoris Bati ʒi. Aquae destillatae ʒii. Misce. DS. 2—3 mal täglich einzuträufeln oder um- zuschlagen.</p>	—	8
<p>NB. Praeparatio liquoris Bati. Rp. Cupri sulfurici Noli armenae ana ʒi. Camphorae tritae ʒii. Misce fiat pulvis. Hujus mixtionis ʒii affunde Aquae bullientis ʒxii. digere tunc filtra. Sign. Liquor Bati.</p>	—	10
<p>IX. Unguenta ophthalmica. Unguentum Belladonnae. Rp. Extracti foliorum belladonnae $\text{ʒʒ}-3\text{ʒ}$. tere cum pauxillo aquae et admisco Axungiae porci ʒi. D. usui.</p>	—	13—17

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Unguentum Boli albae. (sec. Baer) Rp. Boli albae \mathfrak{J} i. Mercurii praecipitati albi gr xv. Butyri recent. insulsi $\frac{3}{3}$. Misce fiat l. a. unguentum.	—	12
Unguentum ophthalmicum Janini. Rp. Tutiae praeparatae Boli armenae ana \mathfrak{J} ii. Mercurii praecipitati albi \mathfrak{J} i. Axungiae porci $\frac{3}{3}$. Misce fiat l. a. unguentum.	—	19
Unguentum ophthalmicum rubrum (Beerii). Rp. Mercurii praecipitati rubri gr viii— \mathfrak{J} β. Tutiae praeparatae gr vi. Butyri recent. insulsi $\frac{3}{3}$. Misce fiat l. a. unguentum.	—	10
Unguentum opiatum cum Mercurio. Rp. Unguenti neapolitani \mathfrak{J} ii. Opil puri grv. Misce fiat unguentum.	—	10

III. Hauptabtheilung.

FORMELN DER SYPHILIDO-KLINIK.

I. Unterabtheilung.

FORMELN ZUM INNEREN GEBRAUCH.

Erster Abschnitt.

Für nicht virulente Affectionen.

I. Classe.

Balsamum Copaivae et Cubebae.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>1. Balsamum Copaivae.</p> <p>a) Balsamum Copaivae. (à 3i c. vitro.)</p> <p>Gebrauch. 30—60 Tropfen mehrmals des Tags in Zuckerwasser zu nehmen.</p>	—	8
<p>b) Emulsio balsami Copaivae.</p> <p>Rp. Balsami copaivae Pulveris gummi mimosae ana 3ii—3ß. Aqua destillatae 3viii. fiat lege artis emulsio, cui adde Syrupi florum Naphae 3i.</p> <p>MDS. Stündlich 2 Löffel voll zu nehmen.</p>	—	29—36
<p>c) Mixtura Choparti.</p> <p>Rp. Resinae copaivae Alcoholis rectificatissimi Syrupi balsami de Tolu Aqua menthae piperitae florum Naphae ana 3ii. Spiritus nitri dulcis 3ii.</p> <p>MDS. Täglich 2 bis 6 Löffel voll zu nehmen.</p>	1	37

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>d) Mixtura Delpechi.</p> <p>Rp. Balsami copaivae $\mathfrak{z}\text{i}$. Acidi sulfurici $\mathfrak{z}\text{i}$. Aquae menthae crispae „ florum naphae ana $\mathfrak{z}\text{ii}$. Syrupi citri $\mathfrak{z}\text{i}/\mathfrak{z}$.</p> <p>MDS. Zwei, vier bis fünf Löffel voll des Tags zu nehmen.</p>	—	54
<p>e) Balsamum Copaivae cum oleo terebinthinae.</p> <p>Rp. Balsami copaivae $\mathfrak{z}\text{vi}$. Olei terebinthinae $\mathfrak{z}\text{i}$. Tincturae aromaticae $\mathfrak{z}\text{ii}$. Vini hispanici $\mathfrak{z}\text{i}$.</p> <p>MDS. 4 mal einen Kaffeelöffel voll zu nehmen.</p>	—	24
<p>f) Balsamum Copaivae cum vino hispanico. (in Val de Grace gebräuchlich.)</p> <p>Rp. Balsami copaivae $\mathfrak{z}\text{i}$. Mucilaginis gummi mimosae $\mathfrak{z}\text{ii}$. Vini xerici $\mathfrak{z}\text{iv}$.</p> <p>MDS. Zweimal täglich oder den vierten Theil öfters einzunehmen.</p>	—	44
<p>2. Cubebae.</p> <p>a) Pulvis Cubebarum.</p> <p>Rp. Pulveris cubebarum $\mathfrak{z}\text{i}$. dentur tales doses Nr. viii.</p> <p>S. Alle 2 Stunden ein Pulver in Wasser oder in Oblaten zu nehmen.</p>	—	17

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>b) Pulvis Cubebarum ferruginosus. (Ricord.)</p> <p>Rp. Pulvis cubebarum 3i. Ferri carbonici 3/3. Elaeosacchari cinnamomi 9/3. M. f. pulvis, dentur tales doses Nro. VI. DS. Dreimal täglich ein Pulver zu nehmen.</p>	—	39
<p>c) Pilulae et boli Cubebarum cum balsamo Copaivae. (Wagner.)</p> <p>Rp. Balsami copaivae gr. ii — gr. iv. Pulveris cubebarum gr. iii — gr. vi. tere cum quant. sufficiente vitelli ovorum ut fiat massa e qua formetur pilula una seu bolus unus. Dentur tales doses Nro. LX. Conducantur cum integimento ex amylo et sac- charo albo parato.</p> <p>DS. Dreimal 30 Pillen oder 3mal 15 Boli des Tage zu nehmen.</p>	—	26—53
<p>d) Electuarium Cubebarum.</p> <p>Rp. Pulveris cubebarum 3ii. Balsami copaivae 3vi. Conservae rosarum 3i. Acidi sulfurici diluti gtt. v. M. f. electuarium.</p> <p>DS. Täglich einigemal einen Theelöffel voll zu neh- men.</p>	—	35

II. Classe.

Clysmata.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Clyisma cum Argento nitrico.</p> <p>Rp. Argenti nitrici crystallisati gr. i — gr. iii. Aqua destillatae ℥i.</p> <p>MDS. Mittelst einer kleinen Spritze auf einmal in den Mastdarm einzuspritzen. Wird der darauffolgende Schmerz zu heftig, so gibt man das Clyisma simpl. Bei Blennorrhagia ani etc.</p>	—	7—8
<p>Clyisma e balsamo Copaivae.</p> <p>Rp. Balsami copaivae ℥ii—3vi. Vitelli ovi nro. 1. Aqua fontanae ℥vi. Ft. l. art. emulsio (Extracti opii aquosi gr. i).</p> <p>DS. Zum Klystier — 2—3mal, wenn der Copaiva-Balsam innerlich nicht vertragen wird.</p>	—	15—22 —27

III. Classe.

Injectiones.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
A. Für die Harnröhre bei Männern.		
1) Injectiones emollientes et anodynae.		
Injectio cum decocto capitum Papaveris albi.		
Rp. Capitum papaveris albi $\mathfrak{z}\text{i}$. coque cum aqua fontana q. s. colaturae $\mathfrak{z}\text{vi}$ adde Tincturae opii crocatae $\mathfrak{v}\text{i}$ — $\mathfrak{z}\text{i}$.	—	18—23
MDS. Oeftern des Tags davon einzuspritzen.		
Injectio cum emulsione Papaveris albi.		
Rp. Seminum papaveris albi $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$. Fiat cum aq. font. emulsio $\mathfrak{z}\text{vi}$ cui adde Aquae laurocerasi $\mathfrak{z}\text{i}$.	—	15
MDS. Alle 1—2 Stunden davon einzuspritzen.		
Injectio narcotica.		
Rp. Extracti opii aquosi gr. i — gr. iii. solve in Aquae destillatae $\mathfrak{z}\text{ii}$. „ laurocerasi $\mathfrak{z}\text{i}$.	—	14
MDS. 2—3mal davon einzuspritzen.		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
2) Injectiones adstringentes. (nach der acuten Periode des Trippers). Injectio cum Alumine. Rp. Aluminis crudi gr. xvi. solve in Aquae rosarum ℥vi. MDS. Wohl umgeschüttelt zum Einspritzen.	—	13
* Injectio cum Argento nitrico. Rp. Argenti nitrici crystallisati gr. ¼ — gr. i. solve in Aquae destillatae ℥i. MDS. Zum Einspritzen.	—	7
* Injectio cum Argento nitrico composita. (Injectio berolinens.) Rp. Argenti nitrici crystallisati gr. β — gr. i. Inulini gr. v. Mucilaginis gummi mimosae ℥i/β. Aquae laurocerasii ℥β. „ rosarum ℥i. MDS. Wohl umgeschüttelt 2—3 mal täglich einspritzen.	—	25
Injectio cum Chinino sulfurico. Rp. Chinini sulfurici gr. vi. solve in Acidi sulfurici gtt. vi. Aquae destillatae ℥i. MDS. Zum Einspritzen.	—	19

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Injectio cum Cupro sulfurico. Wie beim Argent. nitr. — gr. β —i auf ξ i aq. destill.		
*Injectio cum Ferro jodato. Rp. Ferri jodati gr. β — iii — ix (?). solve in Aquae destillatae ξ i. MDS. Zum Einspritzen.	—	6—10
Injectio cum Hydrargyro muriatico corrosivo. Rp. Mercurii sublimati corrosivi gr. ii. Aquae destillatae ξ viii. MDS. Zum Einspritzen.	—	11
*Injectio cum Plumbo acetico. Rp. Plumbi acetici crystallisati \mathfrak{D} ii. solve in Aquae rosarum ξ vi. Laud. liq. Sydenhami \mathfrak{D} i. MDS. Zum Einspritzen. oder Rp. Plumbi acetici crystallisati gr. viii. solve in Aquae destillatae ξ iv adde Mucilaginis gummi mimosae ξ \beta. Aquae laurocerasi ξ ii.	— —	16 14
Injectio cum tinctura Jodi. Rp. Tincturae jodi gtt. x. Aquae destillatae ξ i. MDS. Zum Einspritzen.	—	6

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>* Injectio vinosa.</p> <p>Rp. Vini rubri gallici ℥ii — ℥iv. (sive vini rubri Port.) Aquae rosarum ℥iv.</p> <p>MDS. Wie oben. Man steigt mit der Quantität des Weins, und wendet ihn zuletzt allein an, wenn keine Reizung erfolgt.</p>	—	17—25
<p>Injectio vinosa cum Tannino.</p> <p>Rp. Tannini puri gr. vi. tere cum Vini aromatici ℥ii.</p> <p>MDS. Dreimal täglich davon einzuspritzen.</p>	—	16
<p>Injectio cum Zinco.</p> <p>(sulfuric., acet., muriat.)</p> <p>Rp. Zinci sulfurici ℥i — 3℥. seu (Zinci acetici gr. xii). seu *(Zinci muriatici gr. viii). solve in Aquae rosarum ℥viii. adde (Tincturae opii crocatae ℥i — 3i).</p> <p>MDS. Zum Einspritzen.</p> <p>NB. Bei allen adstringirenden Einspritzungen wird in der Regel 2—4—6 mal täglich eingespritzt, und die Einspritzung 1—2 Minuten in der Harnröhre gelassen. Die mit einem * bezeichneten Formeln werden am häufigsten angewendet.</p>	—	16—19 —24

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p align="center">3) Injectiones causticae.</p> <p>* Injectio caustica cum Argento nitrico.</p> <p>Rp. Argenti nitrici crystallisati $\mathfrak{D}\beta$. solve in Aquae destillatae $\mathfrak{z}\text{i}$.</p> <p>DS. Mit Vorsicht einmal einzuspritzen.</p>	—	11
<p>Injectio caustica cum Hydrargyro nitrico.</p> <p>Rp. Hydrargyri nitrici $\mathfrak{D}\text{i} - \text{ii}$. Aquae destillatae $\mathfrak{z}\text{i}$.</p> <p>MDS. Wie das vorige zu gebrauchen.</p>	—	9—12
<p align="center">B. Einspritzungen für die Scheide.</p> <p>1) Injectiones, emollientes et anodynae.</p> <p align="center">* Injectio anodyna.</p> <p>Rp. Seminis lini $\mathfrak{z}\text{i}$. coque suff. quant. aq. ut fiat colatura $\mathfrak{x}\text{i}$ cui adde Tincturae opii crocatae $\mathfrak{z}\text{i}$.</p> <p>MDS. Zum Einspritzen.</p> <p>Bei den Einspritzungen dieser und der nächstfolgenden Rubrik (B. 1 und 2) wird in der Regel 2—3mal täglich eingespritzt, und zwar in der Rückenlage, damit die Injection einige Zeit auf die afficirten Stellen einwirke, oder man tamponirt mit Charpie, die mit der betreffenden Injection getränkt ist.</p>	—	25

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>* <i>Injectio emolliens.</i></p> <p>Rp. Specierum emollientium ℥iii. coque cum aq. font. q. s. sub. fin. coct. adde Florum chamomillae ℥i. colat. mens. i.</p> <p>DS. Zum Einspritzen.</p>	—	38
<p>* <i>Injectio cum decocto capitum Papaveris albi.</i></p> <p>Rp. Capitum papaveris albi ℥iii. coq. per horam quadrantem ad colat. ma. i/3.</p> <p>DS. Zum Einspritzen.</p>	—	37
<p>2) <i>Injectiones adstringentes.</i></p> <p>* <i>Injectio cum Acido nitrico.</i></p> <p>Rp. Acidi nitrici ℥i—℥ii. Aquaë fontanae ℥i.</p> <p>MDS. Zu Einspritzungen.</p>	—	12—24
<p>* <i>Injectio cum Alumine crudo.</i></p> <p>Rp. Aluminis crudi ℥i—℥i. solve in Aquaë fontanae ℥i.</p> <p>DS. Täglich 2 bis 3 mal davon einzuspritzen.</p>	—	10—12
<p><i>Injectio cum aqua Calcis.</i></p> <p>Rp. Aquaë Calcis ℥i.</p> <p>DS. Zum Einspritzen.</p>	—	6

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Injectio cum aqua Calcis et Catechu. Rp. Catechu pulv. Gg. resin. Myrrhae ana ʒi. Aquae calcis ʒiv. MDS. Zum Einspritzen.	—	14
* Injectio cum aqua chlorata. Rp. Aquae chloratae ʒii. „ destillatae Mens. ʒ. MDS. Zum Einspritzen.	—	28
* Injectio cum Argento nitrico. Rp. Argenti nitrici cryst. gr. x. Aquae destillatae ʒi. MDS. Zum Einspritzen.	—	11
* Injectio cum Calcaria chlorata. Rp. Calcariae chloratae ʒiii. Aquae destillatae ms. i. MDS. Zum Einspritzen.	—	40
* Injectio cum decocto corticis Quercus. Rp. Corticis quercus ʒi—ʒii. coque cum aquae font. q. s. ad colaturam ʒxii. (Pulveris Kino ʒi—ʒii.) (Aluminis crudi ʒi—ʒiii.) DS. 2 bis 3 mal damit einzuspritzen.	—	26—33

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Injectio cum infuso herbae Cicutae. Rp. Herbae cicutae ℥i. infunde aq. fervid. q. s. colat. ℥x. (Ferri sulfurici ℥i. seu muriatici.) DS. Zum Einspritzen.	—	17
Injectio cum Hydrargyro muriatico corrosivo. Rp. Hydrargyri muriatici corrosivi ℥i. solve in Aquae destillatae ℥xii. DS. Zum Einspritzen.	—	15
*Injectio cum Plumbo acetico. Rp. Plumbi acetici cryst. ℥i. solve in Aquae destillatae ℥xii. DS. Zum Einspritzen.	—	14
Injectio cum decocto Ratanhiae. Rp. Radicis ratanhiae concis. ℥i. coque cum aq. font. q. s. colat. ℥viii. adde Vini rubri gallici ℥ii—℥iv.	—	30—38
Injectio cum Tannino. Rp. Tannini puri ℥ii—℥i. solve in Vini rubri alc. ℥vi. DS. Einspritzung.	—	15—51

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Injectio cum Zinco sulfurico.</p> <p>Rp. Zinci sulfurici 3ß. solve in Aquae destillatae ms. iß.</p> <p>DS. Einspritzung.</p> <p>NB. Es können ferner zu Scheiden- Injectionen alle Einspritzungen für die männliche Harnröhre verwendet werden, jedoch mit Steigerung der Dosen der Arzneikörper.</p>	—	34
<p>C. Injectiones für die Gebärmutter.</p> <p>Injectiones adstringentes.</p> <p>* Injectio cum Argento nitrico.</p> <p>Rp. Argenti nitrici cryst. gr. i. Aquae destillatae ʒi.</p> <p>DS. Zu 2 Einspritzungen. Lauwarm wöchentlich 1—2 mal mittelst der gläsernen Gebärmutterspritze von Kirsch einzuspritzen.</p>	—	7
<p>* Injectio cum Plumbo acetico crystallisato.</p> <p>Rp. Plumbi acetici cryst. gr. iv. solve in Aquae destillatae ʒii. adde Laudani-liquidi Sydenhami gtts. ii.</p> <p>MDS. Zu 4 Einspritzungen.</p>	—	8

Zweiter Abschnitt,

FORMELN ZUM INNERN GEBRAUCH

für

Virulente Affectionen.

I. Classe.

Pulveres.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Pulvis cum Mercurio praecipitato rubro.</p> <p>Rp. Mercurii ppt. rubri gr. $\frac{1}{8}$. Sacchar. alb. $\mathfrak{D}\beta$. M. f. pulv. dentur tales doses Nr. VIII.</p> <p>S. Täglich 1 Pulver, je nach 4 Tagen steigend, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ bis zu 1 Gran, dann in gleicher Art fallend. Bei secundärer und tertiärer Syphilis.</p>	—	10
<p>Pulvis cum Mercurio praecipitato rubro et Antimonio sulfurato.</p> <p>(Berg.)</p> <p>Rp. Mercurii praecipitati rubri gr. $\frac{1}{8}$. Antimonii sulfurati nigri Sacchari albi ana $\mathfrak{D}\beta$. M. f. pulv. dentur tales doses Nr. VIII.</p> <p>S. Täglich 2mal 1 Pulver zu nehmen und jeden vierten Tag bei frischen und jeden achten Tag bei veralteten Leiden um $\frac{1}{4}$ tel Gran Merc. ppt. rubr. gestiegen, bis der Kranke 1 Gran in einem Tage bekommt, oder sich Salivation einstellt.</p> <p>Schlagen die Pulver durch, wird etwas Opium pur. beigesetzt. Gleichzeitig trinkt der Kranke einen Thee aus Stipit. dulcamarae Radici carici arenariae ana $\mathfrak{z}\text{ii}$. Corticis mezerei $\mathfrak{z}\text{ii}$.</p> <p>Lassen die Erscheinungen nach, so kann man, ohne bis zu 1 Gran Mercur. ppt. rub. zu steigen, mit der Dosis auf obige Art fallen.</p> <p>Indication: Ozaena, Caries syphilitica, ganz vorzüglich aber syphilitische Exantheme.</p>	—	13
	—	19

II. Classe.

Pilulae.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Pilulae Calomelanos cum Cicuta. (Ricord.)</p> <p>Rp. Calomelanos v. h. parati ℥i. Pulveris herbae cicutae Saponis medicati ana ℥ii.</p> <p>Misce, fiat cum mucilagine gummi arabici massa pilularum, e qua form. Nro. XXIV.</p> <p>DS. Täglich eine Pille, jeden fünften Tag eine Pille mehr zu nehmen; tritt kein Ptyalismus ein, steigt man auf diese Art bis zu 6 Pillen.</p> <p>Indication: hartnäckige Anschwellungen in Folge von Epididymitis blennorrhagica.</p>	—	18
<p>Pilulae mercuriales Dzondi.</p> <p>Rp. Hydrargyri muriatici corrosivi gr. xii. solve in aq. dest. q. s. et adde Pulveris micae panis siccatae „ sacchari albi ana ℥iii.</p> <p>ut f. mass. pilularum, e qua formentur Nr. 240.</p> <p>Consp. pulvere cinnamomi.</p> <p>Quaevīs pilula continet $\frac{1}{20}$ grn. mercurii subl. corrosivi.</p> <p>D. Unmittelbar nach dem Essen mit 4 Pillen zu beginnen, jedesmal den zweiten folgenden Tag diese Dosis zu wiederholen und um 2 Pillen zu steigen, so dass am 27sten Tag (Ende der Cur) dreissig Pillen in einem Tage genommen werden. Tritt Ptyalismus ein, so werden sie ausgesetzt, bis derselbe verschwunden ist. Erfolgt Erbrechen, so gibt man einige Tropfen Opium-Tinctur.</p>	—	33

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Tagsüber trinkt Patient eine Tasse Sassaparill-Infusion, bleibt im Bett und geniesst nur Suppe, Weissbrod, Gemüse (nöthigenfalls etwas weiches gebratenes Fleisch. (Curzeit 4 Wochen). — Die Pillen sollen ihrer leichten Zersetzbarkeit wegen nicht über 4 Tage alt sein.</p> <p>Besser vertragen werden :</p>		
<p>Pilulae mercuriales in nosocomio Julii usitatae.</p> <p>Rp. Hydrargyri muriatici corrosivi gr. i. solve in aq. dest. et adde Succi liquiritiae pulv. Mellis despumati q. s. ut f. pilul. Nr. X. Conspergantur pulvere cinnamomi. Quaevis pilula continet $\frac{1}{10}$ grn. merc. subl. corros.</p> <p>Vom 1ten — 5ten Tage nimmt Patient täglich 1 Pille, vom 5ten — 10ten Tage täglich 2 Pillen, vom 10ten — 15ten Tage täglich 4, vom 15ten — 20sten Tage täglich 8 und vom 20sten — 27sten Tage täglich 10 Pillen.</p> <p>Die Pillen werden bei jeder Steigerung neu verschrieben.</p> <p>Die Sublimat-Pillen werden im Julius-Hospital kaum mehr angewendet; vielleicht bei ausgebreiteten tiefgehenden syphilitischen Destructionen der Schleimbäute bei noch ziemlich kräftigen Individuen. Contraindicirt ist ihr Gebrauch bei Tuberculosis (Graviditas?). — Bei allen Mercurial-Curen müssen Zähne und Zahnfleisch gesund sein.</p>	—	13
<p>Pilulae opiatæ camphoratae.</p> <p>Rp. Camphoræ tritæ ℥ii. Extracti opii aquosi gr. viii. Mucilaginis gummi arabici q. s. ut fiant pilulae Nr. XVI. Consp. lycopodio.</p> <p>DS. Des Abends 2—3 Stück zu nehmen; bei Erectionen, Reiz des Blasenhalases.</p>	—	18

		Taxe.	
		fl.	kr.
<p>Pilulae do-</p> <p>Rp. Protojodureti Lactucarii Extracti opii Misce f. mass. e q Consp. pulv. cinna-</p> <p>D. Man beginnt mit um eine Pille, bis die wieder in gleicher We steigt je am 4ten Tage erreicht ist und fällt ein bei Decoct. spec. ligno II. Classe); hat schmale 1/4 Portion.</p> <p>Indication. Secundäre parat des Merkurs wird besten Erfolge angewen Ptyalismus fällt man mit ganz aus, bis diese Zufä mit einer schwächeren Dos können mehrmals wiederh rer Dosis (bis zu 6 Grun Statt des theuern Lactuc irgend ein indifferentes</p>			
<p>erhält schmale Kaffee, Milch. Der Kranke brecher Witte er 4—5 Löff Sassa-parill-Decoct trinkt Patient Löffel (à 9 Un gezeichnetes wei e für Nachmit die Zeit; dann von Sassa-parill-Decoct.</p> <p>ist jede Nah 18 5 Roob lang Sassa 18 5 Roob ver ist die Wie Patient noch er Weise und</p> <p>trinkt Patient Diarrhöe ein, schwächlichen die Vorberei wird nur vege des Roob in so kann von 3 und 5 zwischen</p> <p>erirte sehr</p>			

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Repetatur eadem operatio bis cum residuo. — Decantatis tribus decoctis et mixtis adde</p> <p>Florum boraginis " rosarum alb. Seminis anisi vulg. ana ʒii. Foliorum sennae ʒi/3. coquendo reducantur ad dimid. part., filtrentur, deinde adde</p> <p>Sacchari albi Mellis despumati ana ʒii.</p> <p>S. Täglich 2—4 Unzen zu verbrauchen. Gebrauch, Wirkung und Indication ist so ziemlich gleich wie bei Roob de Lafecteur.</p>	1	30 à 1 g
<p>Syrupus seu Roob ferruginosus.</p> <p>Rp. Roob de Lafecteur ʒi. (seu Roob sudorifici) Ferri Jodati ʒi.</p> <p>MDS. Täglich 2—6 Esslöffel nehmen.</p>	2	10
<p>Syrupus ferruginosus cum Tanhia.</p> <p>Rp. Syrupus Gummi de Tolu Ferri oxydulat Extractum Tanhiae ana ʒi.</p> <p>MDS. Täglich 2—6 Esslöffel.</p>	4	8
<p>Syrupus sudorificus.</p> <p>Rp. Radicis Rasurae Aqua macera per horam partem, cola Sacchari albi Täglich 2—4 Unzen</p>		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Pilulae Jodureti Hydrargyri. (Ricord.)</p> <p>Rp. Protojodureti hydrargyri Lactucarii parisiensis ana 3ß. Extracti opii aquosi gr. ix. " ligni guajaci 3i. Misce f. mass. e qua formentur pilulae Nr. XXXVI. Consp. pulv. cinuamomi.</p> <p>D. Man beginnt mit einer Pille und steigt zweitägig um eine Pille, bis die Hälfte genommen, dann fällt man wieder in gleicher Weise mit denselben — oder man steigt je am 4ten Tage erst um 1 Pille bis die Hälfte erreicht ist und fällt ebenso wieder. Patient trinkt dabei Decoct. spec. lignorum; bleibt im Bett (v. I. Abthl. II. Classe); hat schmale Kost; in der Regel Diät, später 1/4 Portion.</p> <p>Indication. Secundäre, tertiäre Syphilis. — Dieses Präparat des Merkurs wird am häufigsten, und mit dem besten Erfolge angewendet. Bei Erscheinungen von Ptyalismus fällt man mit der Gabe, oder setzt das Mittel ganz aus, bis diese Zufälle vorüber sind, worauf man mit einer schwächeren Dosis wieder beginnt. Die Pillen können mehrmals wiederholt, und selbst in noch grösserer Dosis (bis zu 6 Gran täglich) gereicht werden. — Statt des theuern Lactucarium paris. könnte man auch irgend ein indifferentes Extract nehmen.</p>	1	6

III. Classe.

Roob et Syrupi.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Roob antisymphiliticus. (par Boiveau L'affecteur.) (Ursprüngliche Formel.)</p> <p>Rp. Radicis sassaparillae prts iii. Ligni guajaci raspati Radicis chinae nodosae Ligni sassafras ana prts ii. Corticis chinae flavae prt. i. Florum boraginis prt. 1/2. Seminis anisi prt. 1/9.</p> <p>Macera species in aqua fontana per dies tres, tunc excoque per horam unam, residuum iterum excoque c. aq. fontana, dein evapora liquores ad consistentiam mellaginis et adde</p> <p>Syrupi sacchari prts x. D. —</p>		
<p>Formula in nosocomio Juliano usitata.</p> <p>Rp. Radicis sassaparillae „ caricis arenariae ana ℥ vii. Ligni sassafras „ guajaci ana ℥ vi. Corticis chinae flavae Radicis chinae nodosae ana ℥ iv.</p> <p>C. C. macera per dies xii, tunc saepius excoque, dein evapora ad mellaginis consistentiam et adde</p> <p>Sacchari albi ℥ xx. Elaeosacchari anisi ℥ iii.</p> <p>M. f. roob. —</p> <p>Als Vorbereitungsur nimmt der Kranke einige</p>	—	12 à 3i

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Tage (4) vorher ein gelindes Abführmittel, erhält schmale vegetabilische Kost, meidet alle Spirituosa, Kaffee, Milch. Am 5ten Tag beginnt die eigentliche Cur. Der Kranke bleibt im Bett; nur bei sehr warmer, trockener Witterung darf er ins Freie. Früh 6 Uhr nimmt er 4—6 Löffel Roob; zum Getränke ist nur das Sassaparill-Decoct (siehe oben) erlaubt. Von diesem Decoct trinkt Patient zwischen 8 und 12 Uhr Vormittags 6—7 Gläser (à 9 Unzen); zur Mittagkost erhält er 4 Loth gebratenes weiches Fleisch, 6 Loth Weissbrod. Um 4 Uhr Nachmittags nimmt er dieselbe Portion Roob wie früh; dann von 6 Uhr bis 8½ Uhr Abends 5 Gläser Sassaparilldecoct, um 9 Uhr Abendessen wie Mittags.</p> <p>Ausser etwas Bouillon, weichen Eiern ist jede Nahrung verboten. Meist werden auf diese Art 48 $\frac{3}{4}$ Roob verbraucht. Dann derselbe ausgesetzt, 5 Tage lang Sassaparilldecoct fortgetrunken und nochmals 48 $\frac{3}{4}$ Roob verbraucht, bis die Cur vollendet. Manchmal ist die Wiederholung nothwendig. Zum Schlusse trinkt Patient noch 14 Tage das Sassaparilldecoct in obiger Weise und schliesst die Cur mit einem Laxans.</p> <p>Erregt der Roob zu viel Schweisse, so trinkt Patient nur die Hälfte des Sassaparilldecocts; tritt Diarrhöe ein, so fällt man mit der Gabe des Roob; bei schwächlichen Individuen und in dringenden Fällen bleibt die Vorbereitungscur weg; bei fieberhaften Zuständen wird nur vegetabilische Kost gereicht. Wird die Gabe des Roob in obiger Weise und nüchtern nicht vertragen, so kann man ihn auch um 9 und 11 Uhr früh und um 3 und 5 Uhr Nachmittags und die Sassaparillabkochung dazwischen nehmen lassen (Juliushospital).</p> <p>Indication. Gegen secundäre, tertiäre, inveterirte Syphilis, Mercurial-Kachexie (wird im Juliusspitale sehr häufig angewendet).</p>		
<p>Roob seu Syrupus de Cuisinier.</p> <p>Rp. Radicis sassaparillae \mathfrak{z}xxx. inf. c. aq. fontan. \mathfrak{z}xxiv et dig. per xxiv horas, deinde reducantur per coctionem ad colaturam \mathfrak{z} viii.</p>		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Repetatur eadem operatio bis cum residuo. — Decantatis tribus decoctis et mixtis adde Florū boraginīs „ rosarū alb. Seminis anisi vulg. ana ℥ii. Foliorum sennae ℥i/3. coquendo reducantur ad dimid. part., filtrentur, deinde adde Sacchari albi Mellis despumati ana ℥ii.</p> <p>S. Täglich 2—4 Unzen zu verbrauchen. Gebrauch, Wirkung und Indication ist so ziemlich gleich wie bei Roob de Laffecteur.</p>	1	30 à 1 g
<p>Syrupus seu Roob ferruginosus.</p> <p>Rp. Roob de Laffecteur ℥i. (seu Roob sudorifici) Ferri iodati ℥i.</p> <p>MDS. Täglich 2—6 Esslöffel voll zu nehmen.</p>	2	10
<p>Syrupus ferruginosus cum Ratanhia.</p> <p>Rp. Syrupus balsami de Tolu ℥i. Ferri carbonici oxydulati Extracti ratanhiae ana 3vi.</p> <p>MDS. Täglich 4—6 Esslöffel.</p>	4	8
<p>Syrupus sudorificus. (Ricord.)</p> <p>Rp. Radicis sassaparillae concis. Rasurae ligni guajaci ana 3vi. Aquae fontanae ℥iv. macera per horas 24, coque leni igne ad dimidiam partem, cola et exprime, dein adde Sacchari albi ℥i—ii.</p> <p>S. Täglich 2—4 Unzen zu nehmen.</p>	1	30 à 1 g

IV. Classe.

Decocta, Infusa, Solutiones.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p style="text-align: center;">Decoctum Felzii. (Lagneau.)</p> <p style="text-align: center;">a)</p> <p>Rp. Antimonii crudi pulverisati $\mathfrak{z}\text{iv}$. Radici sassaparillae concis. $\mathfrak{z}\text{ii}$. " chinæ nodosae contus. Herbae hederæ terrestriſ Ligni buxi concisi ana $\mathfrak{z}\text{i}\mathfrak{z}$. Coque c. aq. font. $\mathfrak{z}\text{xii}$ ad remanentiam $\mathfrak{z}\text{vi}$. D. —</p>	1	50
<p style="text-align: center;">b)</p> <p style="text-align: center;">Einfachere Formel: de l'Hopital des Veneriens de Paris.</p> <p>Rp. Antimonii crudi pulveris. in nodulo $\mathfrak{z}\text{iv}$. Ichthyocollae concisae $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$. (seu pulv. gi. arab.) Radici sassaparillae conc. $\mathfrak{z}\text{iii}$. Coque cum aq. font. $\mathfrak{z}\text{vi}$ ad remanentiam $\mathfrak{z}\text{iii}$. S. Täglich 2 Pfund davon in drei Portionen zu trinken und zwar Morgens um 7 Uhr, Nachmittags um 2 Uhr und Abends um 9 Uhr. Dabei nur zwei Mahlzeiten aus Suppe, etwas Rindfleisch und Obst mit Weissbrod. — Curzeit 30—60 Tage. — Gebrauch bei inveterirter tertiärer Syphilis.</p>	1	50 (34)
<p style="text-align: center;">Decoctum Pollini.</p> <p>Rp Corticum nucum juglandis regiae ruditer contus. $\mathfrak{z}\text{x}$.</p>		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Macera per noctem in aqua calida, deinde mane adde</p> <p>Radiciſſaſſaparillae .</p> <p>„ chinae nodosae</p> <p>Lapidiſ pumiciſ petia ligator.</p> <p>Antimonii crudi ana $\frac{3}{\beta}$.</p> <p>Coque cum aquae fontanae menſ. ii in olla bene clauſa per aliquot horas, deinde addice petiam et coque reſiduum ad dimidiam conſumptionem.</p> <p>Die eine Hälfte davon nüchtern in zwei Portionen kalt, die andere Abends ebenſo zu nehmen und jedesmal eine Tasse warmen Thees nachzutrinken. Dabei ſchmale Koſt — mehr Mehlspeiſen. — Wöchentlich dreimal ein Bad. — Curzeit 3—6 Wochen. —</p> <p>Die Anwendung dieſes Decocts findet ſtatt bei tertiärer Syphilis, beſonders ſcrofulöſer Individuen.</p>	1	14
<p>Decoctum Saſſaparillae forte ſeu antiſyphiliticum forte.</p> <p>Rp. Radiciſſaſſaparillae</p> <p>Stipitum dulcamarae</p> <p>Rasurae ligni guaſſiaci ana $\frac{3}{i}$.</p> <p>coque et ſub fin. coct. infunde</p> <p>Foliorum ſennae</p> <p>Seminis phellandri aquat. cont. ana $\frac{3}{ii}$.</p> <p>Colat. fortiter deſſeſſae $\frac{3}{xvi}$ adde</p> <p>Melliſ deſpumati $\frac{3}{i\beta}$.</p> <p>MDS. Tagſüber zu trinken.</p>	—	56
<p>Decoctum Saſſaparillae tenue ſeu antiſyphiliticum tenue.</p> <p>Rp. Radiciſſaſſaparillae $\frac{3}{i}$.</p> <p>„ graminis $\frac{3}{i\beta}$.</p> <p>coq. c. ſuff. quant. aq. ſub fin. coct. infunde</p> <p>Foliorum ſennae $\frac{3}{ii}$.</p> <p>Colaturae fortiter expreſſ. $\frac{3}{viii}$ adde</p> <p>Sacchari albi $\frac{3}{vi}$.</p> <p>MDS. Tagſüber zu trinken.</p>	—	50

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Decoctum Sassaparillae cum cortice Mezerei. Rp. Corticis merzeri conels. ℥ii . coque in aq. font. ℥iii ad remanentiam ℥ii , sub fin. coct. adde Radici ^s sassaparillae ℥iii . ,, liquiritiae ℥β . DS. Tagsüber zu verbrauchen.	1	19
Decoctum sudorificum. (Parmentier.) Rp. Rasurae ligni guajaci Radici ^s sassaparillae ,, chinae nodosae ana ℥iii . inf. aq. fervid. ℥iii et coque ad remanentiam ℥ii , sub fin. coct. adde Rasurae ligni sassafras ℥i . et cola. In denselben Fällen wie das Decoctum specierum lignorum. —	—	45
Decoctum Zittmanni fortius. Rp. Radici ^s sassaparillae ℥xii . infunde aq. font. mens. xxiv dig. per horas xxiv, dein infuso immitatur saccul. qui includit Sacchari aluminati ℥iβ . Hydrargyri muriatici mitis ℥β . Cinnabaris factit. ℥i . Coque ad remanentiam ms. viii. sub fin. coct. adde Seminis anisi contus. ,, foeniculi contus. ana ℥β . Foliorum sennae alexandrin. ℥iii . Radici ^s liquiritiae ℥iβ . Cola et exprime. Liquorem obtentum decanta et ingere in lagenas viii. S. Decoctum fortius,	8	— sine lagen.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Decoctum Zittmanni mitius.</p> <p>Speciebus residuis denuo addantur Radice sassaparillae concis. 3vi. coque c. aq. font. mens. xxiv. ad remanentiam mens. viii. sub fin. coct. adjiciantur Corticis citri „ cinnamomi Seminis cardamomi min. Radice liquiritiae ana 3iii. exprimendo cola et ingere colaturam bene decantatam in lagenas viii. S. Decoctum mitius.</p> <p>Gebruchsweise: Am 1. Tage ein Laxans aus Calomel und Jalappe. — Die vier folgenden Tage bleibt Patient Morgens im Bette, und trinkt dabei eine Bouleille erwärmtes, starkes, Nachmittags eine Bouleille nicht erwärmtes, schwaches Decoct.</p> <p>Am 6. Tage ein Laxans, wie am 1. Tage. Die vier folgenden Tage (6. — 10.) wieder die Decocta, wie vom 2. bis 5. Tage. — —</p> <p>Laxirt Patient zu viel, so bleibt das 2. Laxans weg; an den Tagen, an welchen das Laxans genommen wird, strenge Diät (3mal 1 Suppe), an den übrigen 4 Loth gebratenes weiches Fleisch, und ebensoviel Weissbrod.</p> <p>Nach dem Verbrauch von diesen 8 Bouleillen starkem und 8 Bouleillen schwachem Decoct ruht der Kranke mehrere Tage, bleibt im Zimmer, trinkt das Decoct. der Species lignor. oder Sassaparill., und erhält noch schmale Kost. — Ist er noch nicht geheilt, so wiederholt er die Cur zur Hälfte, oder ganz. — Diese ziemlich strenge Cur (nach Chelius) muss nach Constitution und Art des Leidens modificirt werden (Theden), z. B. nur die Hälfte des Decoct. fort., mehr Suppen etc.</p> <p>Indication. Bei secundärer, tertiärer Syphilis, nach erfolglosem Gebrauch oder Missbrauch des Mercuri, bei noch nicht ganz heruntergekommenen Individuen; über 3mal darf die Cur nicht durchgemacht werden. — (Wird im Julius-Hospital sehr oft angewendet.)</p>	4	— sine lagen.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Infusum Sassaparillae.</p> <p>Rp. Radicis sassaparillae ℥ii. liquiritiae ℥i. Seminis foeniculi ℥i. C. C. infunde aq. fervid. ℥ii et macera per ho- ras 24 tunc exprime et cola.</p> <p>S. Tagsüber zum Getränke.</p>	1	3
<p>Liquor Hydrargyri muriatici corrosivi. (Liquor Swietenis.)</p> <p>Rp. Mercurii sublimati corrosivi gr. viii. solve in Spiritus vini rectificati ℥i/3. et Aquae destillatae ℥xiv/3. (Uncia una hujus liquoris continet gr. i merc. subl. corr.)</p> <p>DS. Täglich 1/2 Löffel voll — steigend bis zu 1 Löffel, in 2—3 Dosen getheilt in einer Tasse Milch, Sassapa- rillabkochung u. s. f. zu nehmen. — Bei eintretenden Magenschmerzen wird 1 Löffel Syrup. diacodii jedesmal zugesetzt. — Indication und Cautelen wie bei den Dzondi'schen Pillen. —</p>	—	20

V. Classe.

Gargarismata.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Vergleiche die Gargarismata. I. Abthl. Class. X.</p> <p>Gargarisma cum Acido muriatico.</p> <p>Rp. Acid. muriat. puri gtts xx. Aqua destillatae ℥vii. Mellis rosarum ℥i.</p> <p>MDS. Gurgelwasser. Bei Aphthen, Stomatitis mercurialis.</p>	—	16
<p>Gargarisma cum Alumine crudo.</p> <p>Rp. Aluminis crudi ℥i. solve in Aqua destillatae ℥vii. Mellis rosati ℥i.</p> <p>MDS. Gurgelwasser. Bei Aphthen und leichtem Ptyalismus.</p>	—	16
<p>Gargarisma cum cortice Chinae rubrae.</p> <p>Rp. Corticis chinae rubrae ℥ii. coque cum aq. font. ℥xii. ad colat. ℥viii.</p> <p>DS. Gurgelwasser. Bei Gangrän der Mundhöhle setzt man Extr. op. aq. gr. i auf ℥i zu, bei örtlichem Scorbut, anhaltender Auflockerung des Zahnfleisches Tinct. cochleariae ℥ii.</p>	—	26

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Gargarisma cum Kali hydrojodifico. Rp. Kali hydrojodifici ʒi. solve in Aquae destillatae ʒviii. Mellis despumati ʒʒ. MDS. Gurgelwasser. Bei zurückgebliebenen Härten der Mandeln nach vorausgegangenen Schankern.	—	32
Gargarisma cum Mercurio sublimato corrosivo. Rp. Hydrargyri muriatici corrosivi gr. ii — gr. viii. solve in Infusi herbae cicutae ʒi — ʒviii. DS. Gurgelwasser. Bei Halsschankern nach der acuten Periode.	—	18

II. Unterabtheilung.

FORMELN DER SYPHILIDO-KLINIK

zum

äussern Gebrauch.

I. Classe.

Species et Fomentationes.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Species.</p> <p>vide II. Hauptabtheilung. I. Classe.</p> <p>Fomentationes.</p> <p>Fomentatio chlorata.</p> <p>Rp. Infusi specierum aromaticarum $\text{ʒi}-\text{ʒx}$. Aquae chloratae ʒii. MDS. Zu Umschlägen; bei phagadänisch-gangränösem Schanker.</p>	—	30
<p>Fomentatio cum Calcareae chlorata. (Desruelles.)</p> <p>Rp. Calcareae chloratae $\text{ʒ}\beta-\text{i}$. tere cum Aquae fontanae ʒi. MD. Zu Umschlägen etc. wie beim Vorigen.</p>	—	15—18
<p>Fomentatio jodinica. (Ricord.)</p> <p>Rp. Tincturae jod. $\text{ʒi}-\text{ʒvi}$. Aquae destillatae ʒiii. MDS. Bei indolenten Bubonen, bei der zur Epididymitis sich gesellenden Hydrocele.</p>	—	10—30
<p>Fomentatio cum Natrio chlorato.</p> <p>Rp. Natrii chlorati ʒii.</p>		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>solve in Aquae destillatae ℥vi.</p> <p>DS. Zu Waschungen; man vermehrt die Dosis des Natrium chloratum bis ein Prickeln oder leichtes Brennen entsteht. Die Schleimtuberkel, Condylome etc. werden täglich zweimal damit gewaschen und nachher mit Calomel. anglicanum (i. e. in via humida parat.) bestreut.</p>	—	12
<p>Fomentatio opiata. (Ricord.)</p> <p>Rp. Extracti opii aquosi ℥i—℥ii. solve in Aquae destillatae ℥viii.</p> <p>DS. Zu Umschlägen. Bei brandigen Affectionen. Steigert sich die Reizbarkeit, so wird die Dosis des Opiums vermindert.</p>		36— 1 fl.
<p>Fomentatio opiata composita.</p> <p>Rp. Herbae cicutae " solani nigri ana ℥i. infunde cum aq. font. fervid. q. s. colat. ℥viii. adde Laudani liquidi Sydenhami ℥i—℥ii.</p> <p>MDS. Zu narkotischen Umschlägen.</p>	—	27—35
<p>Fomentatio Zinci muriatici. (Hanke.)</p> <p>Rp. Zinci muriatici gr. ii. Aquae destillatae ℥ii. Acidi muriatici diluti gtt. i.</p> <p>MDS. Charpie damit zu tränken und täglich 4—6mal aufzulegen; diese äusserliche Anwendung des Chlorzinks</p>	—	8

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
nebst gleichzeitig innerem Gebrauch der Mittelsalze nach Frike bei primären syphilitischen Geschwüren wurde seither von bestem Erfolge begleitet.		
<p>Vinum aromaticum. (in nosocomio julian. usitat.)</p> <p>Rp. Herbae majoranae „ rorismarini „ serpylli „ thymi Florum lavandulae ana \mathfrak{zvi}. Caryophyllorum \mathfrak{ziii}. Vini rubri (Medoc) ms. viii. stet in digestionem per triduum, tunc exprime et filtra dein adde Aquae vulnerariae vinosae \mathfrak{zvi}.</p> <p>MDS. Zum Verband syphilitischer Geschwüre, besonders secundärer Hautschanker, exulcerirter Bubonen etc. NB. Es ist durchaus nöthig französischen Rothwein zu nehmen.</p>	—	$\mathfrak{z}i \text{ à } 8$
<p>Vinum aromaticum opiatum. (composit.)</p> <p>Rp. Infusi florum chamom. vulg. (ex $\mathfrak{z}i$ parat) Vini aromatici ana \mathfrak{ziv}. Laudani liquidi Sydenhami $\mathfrak{z}i$—\mathfrak{ziii}.</p> <p>MDS. Aeusserlich.</p>	1	51— 7
<p>Vinum aromaticum cum Tannino.</p> <p>Rp. Vini aromatici \mathfrak{zviii}. in quibus dissolve Tannini purissimi \mathfrak{zii}.</p> <p>DS. Diese beiden eben angegebenen Verbindungen werden wie Vinum aromaticum verwendet.</p>	1	24

II. Classe.

Caustica.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Acidum nitricum.</p> <p>Rp. Acidi nitrici concentrati 3i.</p> <p>DS. Mit feinem Charpiepinsel die Fläche zu bestreichen; hält der sogleich eintretende Schmerz zu lange an, so macht man einige kalte Umschläge. Zu demselben Zwecke und auf gleiche Weise werden die milder wirkenden Tincturae thujae orient., cantharidum, oder das Pulvis cantharidum eingestreut) gebraucht.</p> <p>Bei torpiden exulcerirten Bubonen um gesunde Granulationen hervorzurufen.</p>		
<p>Pasta viennensis.</p> <p>Rp. Kali subcarbonici part. vi. Calcis vivae part. v.</p> <p>M. fiat pulv. DS. Im Augenblicke der Anwendung mit Alkohol zur Paste anzumachen und $\frac{1}{4}$—$\frac{1}{3}$''' dick auf Charpie zu streichen und die Fläche damit zu bedecken. Die Aetzpaste bleibt je nach der Individualität 2—6 Stunden liegen; nach Losstossung des Schorfes Verband mit Ungt. mercuriale, aromatischen Fomentationen, Vin. aromat.</p> <p>Bei indolenten, virulenten Bubonen, sowohl vor als nach der Exulcerationsperiode, späterhin auf die entblösten Ganglien selbst.</p>		
<p>Solutio Cupri sulphurici.</p> <p>Rp. Cupri sulphurici 3i/3. solve in aquae destillatae 3i.</p> <p>MDS. Zum Betupfen der Condylome etc.</p>	—	8

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Solutio concentrata Mercurii sublimati corrosivi. (Malapert.) Rp. Mercurii sublimati corrosivi gr. xx solve in Aquae destillatae ℥i. DS. Zur Cauterisation der Vesicatorstelle bei der Behandlung noch nicht exulcerirter Bubonen.	—	8
Solutio Plenki. (ursprüngliche Formel.) Rp. Hydrargyri muriatici corrosivi Camphorae tritae ana gr. xii. Aluminis crudi Sacchari saturni ana ℥i. Misce terendo, adde Aceti concentrati ℥ii. Solutioni vitro immissae adde Aetheris sulphurici ℥i. Conquassa. DS. Mittelst eines Charpiepinsels die Condylome zu bestreichen.	—	18
Einfachere Formel. (Freiberg.) Rp. Mercurii sublimati corrosivi Camphorae subactae ana 3β solve in sufficiente quantitate Aquae destillatae, admisce spiritus vini recti- ficatissimi ℥i. DS. 2mal täglich die Condylome damit zu bestrei- chen.	—	15

III. Classe.

Unguenta.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Unguentum Belladonnae. Rp. Extracti belladonnae 3ß—3i. Axungiae porci 3ß. M. f. ungt. D. ad oillam. S. Gegen zu heftige Schmerzhaftigkeit des Hodens, bei Orchitis gonorrhoeica.	—	12—16
Unguentum digestivum opiatum. (Parker.) Rp. Opii puri pulv. 3i—3ii. tere cum pauxillo aquae et admisce Unguenti digestivi 3ii. M. f. ungt. DS. Bei irritablen phagadänischen Schankern.	—	42—54
Unguentum cum Hydrargyro cyanato (cyanuret.) (Parent.) Rp. Hydrargyri cyanati gr. xii. Axungiae porci 3i. M. f. ungt. DS. Salbe. Bei inveterirten atonischen syphilitischen Hautaffec- tionen.	—	18
Unguentum cum Hydrargyro jodato. (Bielt.) Rp. Denterojodureti hydrargyri 3ß—3i.		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Axungiae porci 3i. M. f. ungt. DS. Salbe. Bei torpiden inveterirten Schankern.</p>	—	14—22
<p>Unguentum cum Hydrargyro jodureto. Rp. Protojodureti hydrargyri ʒi—3ii. Axungiae porci 3i. M. f. ungt. DS. Salbe. Zur Zertheilung chronischer indolenter Bubonen.</p>	—	18—42
<p>Unguentum cum Hydrargyro muriatico corrosivo cum Opio. (Cullerier, Parker.) Rp. Hydrargyri muriatici corrosivi 3β. Extracti opii aquosi 3i. dissolve in pauxillo aquae et admisce Cerati simplicis Olei olivarum ana 3i. M. f. ungt. D. ad ollam. S. Mit einem feinen Pinsel die Eichel zu bestreichen. Bei Balanitis complicirt mit Phimosis, nachdem die entzündlichen Symptome gewichen sind.</p>	—	54
<p>Unguentum cum Hydrargyro nitrico et Arsenico. (Lee.) Rp. Hydrargyri nitrici oxydati 3ii. Pulveris arsenicalis Cosmi gr. i. Axungiae porci 3iiii. M. f. ungt. Det. ad ollam. S. Zum Bestreichen der Condylome etc., überhaupt Warzen jeder Art.</p>	—	36

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Unguentum Hydrargyri puri.</p> <p>Rp. Unguenti neapolitani ʒi. D. ad ollam. S. Zur Schmiercur. (Die Salbe besteht aus 1 Theil Quecksilber und 2 Theilen Fett, nach Louvrier aus gleichen Theilen). Täglich 1 Drachme, steigend bis 2 Drachmen, zum Einreiben. Die Cur besteht aus 6—9—12 Einreibungen, mit dazwischen zu reichenden Purganzen in 25 Tagen. Die grosse Schmiercur nach Louvrier, Rust und die kleine nach Cullerier sind seit 10 Jahren im Juliushospitale nicht mehr angewendet worden.</p>	—	19
<p>Unguentum Hydrargyri opiatum.</p> <p>Rp. Unguenti hydrargyri cinerei (neapolitani) ʒʒ. Opii puri gr. iv—gr. vi. M. exactiss. f. ungt. D. S. In die Umgebung der Augen einzureiben. Bei Iritis syphilitica.</p>	—	15
<p>Unguentum cum Hydrargyro oxydato rubro.</p> <p>Rp. Mercurii praecipitati rubri gr. i. Cerati simplicis ʒi. M. f. ungt. DS. Auf Charpie gestrichen aufzulegen. Bei Hunter'schen Schankern.</p>	—	6
<p>Unguentum cum Hydrargyro phosphorico oxydulato.</p> <p>Rp. Hydrargyri phosphorici oxydulati gr. viii. Axungiae porci ʒi. M. f. ungt. DS. Täglich Gran V einzureiben bei indolenten Bubonen. Dieselbe Quantität wird in die andere Leiste gegend eingerieben.</p>	—	9

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Unguentum opiatum cum Calomel.</p> <p>Rp. Calomel gr. iii — gr. vi — gr. xii. Cerati opiatı 3i.</p> <p>M. f. ungt. DS. Auf Charpie gestrichen aufzulegen. Bei Hunter'schen Schankern.</p>	—	9
<p>Unguentum cum Plumbo jodato.</p> <p>Rp. Plumbi jodati 3ß. Axungiae porci 3i.</p> <p>M. f. ungt. DS. Salbe. Bei sympathischen Bubonen.</p>	—	21
<p>Mel Hydrargyri protojodureti.</p> <p>Rp. Jodureti mercurii 3i. Mellis despumati 3i.</p> <p>MDS. Jodquecksilberhonig. Zum Einreiben indolenter syphilitischer Tuberkel, nachdem alle örtliche Entzündung getilgt.</p>	—	26
<p>Linimentum chloratum.</p> <p>Rp. Aquae chloratae 3i. Olei amygdalarum dulcium 3i.</p> <p>M. f. linimentum.</p> <p>DS. Zur Beseitigung der violetten Flecken nach syphilitischen Tuberkeln, Pusteln etc.</p>	—	18

IV. Classe.

Emplastra.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Emplastrum Cicutae cum Plumbo iodato. Rp. Plumbi iodati ʒi. Emplastri cicutae ʒi. M. f. empl. DS. Auf ein Stück Leder gestrichen aufzulegen. Bei sympathischen Bubonen, chronischer Anschwellung der Testikel.	—	36
Emplastrum Hydrargyri iodatum. Rp. Emplastri mercurialis ʒi. Jodi puri gr. xv. M. f. l. a. empl. S. Wie beim vorigen.	—	30
Emplastrum mercuriale de Vigo. (Ursprüngliche Formel.) Rp. Mercurii vivi pts. 95. Styracis liquidi pts. 48. miscce terendo usque omnes globuli metallici disparuerint; in olla altera ferrea miscce Emplastri lithargyri pts. 312. Cerae flavae Picis burgundicae Terebinthinae communis ana pts. 16. Gummi res. ammoniaci pts. 10. " res. olibani " res. myrrhae ana pts. 5. Croci pulverisati pts. 3.		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Liquefacta bene misceantur; mixtis adde mercur. c. styrac. contritum.</p> <p>DS. Auf Leinwand, Kattun, dünnes Leder zu streichen.</p>		.
<p>(Einfachere Formel.)</p> <p>Julius-Hospital.</p> <p>Rp. Mercurii vivi $\frac{3i}{3}$. Terebinthinae comm. $\frac{3iii}{3}$. extinctione mercurii peracta adde Styracis liquidi $\frac{3ii}{3}$. Olei laurini $\frac{3\beta}{3}$. tunc massae semiliquidae admisce Emplastri diachylon simplicis $\frac{3vi}{3}$. Cerae flavae $\frac{3iii}{3}$. M. f. l. a. empl.</p> <p>Zum Compressionsverband bei Orchitis gonorrhoeica. Statt dieses Pflasters wird häufig auch das Empl. adhaesiv. angewendet. Ebenso könnte das officinelle Empl. mercurial, composit. oder das Empl. ammoniaci cum hydragyro gebraucht werden.</p>	—	$\frac{3i}{12}$

IV. Hauptabtheilung.

FORMELN FÜR HAUTKRANKHEITEN.

Interna.
I. Classe.
Pilulae.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>1. Pilulae arsenicales. (Pilulae asiaticae)</p> <p>Rp. Acidi arsenicosi $\mathfrak{D}\beta$. Pulveris piperis nigri 3i. contusis et super lapidem marmoreum in pulverem inpalpabilem laevigatis adde terendo Mucilaginis gummi arabici $\mathfrak{D}\text{iv}\beta$. M. fiant pilulae Nro. 120. Consp. pulv. canell. alb. Pilula una continet $\frac{1}{12}$ gran. acidi arsenicosi. (loco pulv. piperis nigri et mucilaginis gummi arabici forsitan melior succus liquirit.) S. Täglich eine Pille zu nehmen. Bei Eczema inveterat., Elephantiasis etc.</p>	—	14
<p>2. Pilulae cum Ferro arsenicico oxydulato. (Biett.)</p> <p>Rp. Ferri arsenicici oxydulati gr. iii. Extracti cicutae 3i. Pulveris radices althaeae 3β. Syrupi capillorum veneris q. s. ut f. l. a. pil. 48, consperg. cum pulv. alth. (pilula una continet gr. $\frac{1}{16}$ ferr. arsen.) S. Täglich eine Pille zu nehmen. Bei Eczema chronicum, Lichen chronicus, Psoriasis, Lupus.</p>	—	16

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
3. Pilulae cum unguento Hydrargyri. (Sedillot.) Rp. Unguenti mercurialis duplcis 3i. Saponis medicati ℥ii. Pastae althaeae ℥i. (Extracti opii aquosi gr. xv). Pulveris althaeae q. s. ut fiant l. a. pilulae Nr. 36. Consp. pulv. althaeae. DS. Täglich 2—3 Stück zu nehmen. Bei eingewurzelter Syphilis mit Erweichung subcuta- ner Hauttuberkel — mit Opium bei dolores osteocopi — bei Lupus. — Man lässt sie 1—1½ Monat lang fort- nehmen.	—	30

II. Classe.

Solutiones.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>4. Solutio Ammonii arsenicici. (Biett.)</p> <p>Rp. Ammonii arsenicici gr. iv. solve in Aquaе destillatae ℥iv.</p> <p>D. Sign. 5—10—20 Tropfen täglich 2—3mal in einem schleimigen Vehikel zu nehmen. Bei chronischem, nässendem, leicht entzündetem Eczem.</p>	—	10
<p>5. Liquor arsenicalis Pearsonii.</p> <p>Rp. Natri arsenicici gr. iv. solve in Aquaе destillatae ℥iv.</p> <p>D. Sign. Wie beim vorigen. Bei Eczema chronicum, Lichen agrius, Lepra, Psoriasis etc.</p>	—	8
<p>6. Solutio arsenicalis Fowleri.</p> <p>par. secundum pharmacopoeam borussicam.</p> <p>D. Sign. 4mal 2—4—6 Tropfen in reinem Wasser zu nehmen. Bei Lupus, Psoriasis etc. (90 Tropfen enthalten Gr. i. Arsenik).</p>	—	4
<p>7. Solutio extracti foliorum Juglandis regiaе.</p> <p>Rp. Extracti foliorum juglandis regiaе. ℥i—℥i. solve in Aquaе menthae crispae ℥i.</p> <p>DS. Tagüber zu verbrauchen bei scrofulösen Haut-Affectionen, Geschwüren etc.</p>	—	8—10

Externa.

I. Classe.

Fomentationes et Lotiones.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>8. Aqua Belli.</p> <p>Rp. Sacchari saturni ℥i. Lactis sulfuris ℥ii. Aquae destillatae ℥xii.</p> <p>MD. Sign. Täglich wohlumgeschüttelt einigemal den Ausschlag damit zu befeuchten.</p> <p>Bei hartnäckigen herpetischen (syphilitischen) Hautkrankheiten.</p>	—	19
<p>9. Lotio alcalinica.</p> <p>Rp. Liquoris Kali caustici ℥i. <u>seu</u> Liquoris Kali subcarbonici ℥ii. Olei olivarum ℥ii — ℥iii. Aquae destillatae ℥i.</p> <p>MD. Sign. Alkalinisches Waschmittel. Bei Prurigo.</p>	—	9
<p>10. Lotio Barlow.</p> <p>Rp. Kali sulfurati ℥ii. Saponis mollis ℥ii/3. Aquae calcis ℥viii. Spiritus vini rectificati ℥i.</p> <p>M. f. lotio. D. Sign. Waschwasser.</p> <p>Die kleinen Schüppchen werden zuerst mit Seifenwasser entfernt; bei Porrigo.</p>	—	16

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>11. Lotio exsiccans. (Blett.)</p> <p>Rp. Zinci sulphurici Plumbi acetici ana ℥i. solve in Aquae rosarum ℥iv. Mucilaginis seminum cydoniorum ℥℔.</p> <p>MDS. Waschwasser. Bei Eczema, Impetigo.</p>	—	20
<p>12. Lotio Gowlandi.</p> <p>Rp. Amygdalarum amararum ℥i. Sacchari albi ℥ii. tere cum aquae dest. ℥ii. ut fiat emulsio, cui adde Mercurii sublimati corrosivi ℥ii.</p> <p>D. Sign. Waschwasser. Bei Acne punctata, indurata.</p>	—	39
<p>13. Lotio hydrocyanica cum Plumbo acetico. (Thomson.)</p> <p>Rp. Acidi hydrocyanici ℥ii—℥℔. Aquae destillatae ℥i—℥ii. Spiritus vini rectificati ℥℔. Plumbi acetici gr. xvi.</p> <p>M. f. lotio. DS. Waschwasser. Bei Impetigo chronic., Prurigo, Erythema chronic. cachecticum, auch als Salbe die Blausäure mit Ceratum Saturni ℥iv verbunden.</p>	1	39 und 9

II. Classe.

Caustica.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>14. Acidum nitricum.</p> <p>Acidi nitrici concentrati 3ii.</p> <p>DS. Mittelst eines Charpiepinsels die betreffenden Stellen zu ätzen, bis ein Schorf sich bildet; dann lässt man Cataplasmen überschlagen, bis der Schorf abfällt, worauf die Aetzung wiederholt, und in gleicher Weise fortgeföhren wird, bis endlich die Haut rein und glatt. —</p> <p>Bei Pustula maligna, bei allen Lupus-Arten (exedens, exfoliatus, hypertrophicus). Wegen des leicht dazu tretenden Erysipels sind, besonders bei Lupus vorax faciei, immer nur kleinere Stellen vorsichtig zu ätzen; in der Regel lässt man einige kalte Umschläge nachher appliciren; innerlich Roob de Laffecteur.</p>	—	7
<p>15. Pasta cum Chloreto Zinci.</p> <p>(Hanke, Canquoin.)</p> <p>Rp. Chloreth zinci Farinae tritici ana part. aequal. <u>seu</u> Chloreth zinci 3i. Farinae tritici 3ii—3iii.</p> <p>M. ft. pulv. D. S. mit etwas Wasser vermischt aufzutragen (als Causticum bei Lupus, Cancer, Elephantiasis, Naevus, Lepra.)</p> <p>Als mildere Form wendet man die Verbindung von 1 Theil Chlorzink mit Zusatz der Hälfte Salzsäure und 8 Theilen Rosensalbe an.</p>	—	12

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>16. Solutio Kali caustici.</p> <p>Rp. Kali caustici 3℥—3i. solve in Aque destillatae ʒi.</p> <p>MD, Sign. Täglich 1—2 mal damit zu betupfen; nebst gleichzeitiger Anwendung von kalten Umschlägen, Douchen bei Psoriasis pustulosa; bei Eczema alle 2 Tage bis die Haut glatt und keine seifenartige Flüssigkeit aussickert; dann die kalte Douche, kalte Umschläge. —</p>	—	10—14

III. Classe.

Unguenta.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>17. Unguentum alkalanicum.</p> <p>Rp. Kali subcarbonici ℥ii. Axungiae porci ℥ii. M. ft. ungt. D. S. Salbe. Bei Lichen, Prurigo, Porriago.</p>	—	16
<p>18. Unguentum anglicum contra scabiem. (in nosocomio Juliano usitatum.)</p> <p>Rp. Kali nitrici pulveris. ℥i. Pulv. rad. veratri albi ℥ii. Sulphuris depurati Saponis nigri Axungiae porci ana ℥i/3. M. f. ungt. D. S. Englische Krätzsalbe.</p> <p>Die Kranken reiben sich mit dieser Salbe am ganzen Körper, besonders aber an den Krätzstellen, mit Ausnahme des Kopfes, Gesichts und der Geschlechtstheile 1/2 Stunde lang ein. Ein Bad vorher ist, wenn der Kranke nicht gerade unreinlich, nicht nothwendig. Auf eine Person rechnet man ℥iv Salbe. Unmittelbar nach dieser Einreibung werden sie nackt in ein frisches Leinentuch gewickelt, und eine wollene Decke herumgeschlagen, in welchen sie 36 Stunden liegen bleiben und schwitzen. Die Leinwand wird bei jedem Kranken frisch gewechselt, die wollenen Decken werden monatlich einmal gereinigt. In der Regel beginnt die Cur des Abends, so dass die Kranken 2 Nächte und 1 Tag im Bette zubringen. Zimmertemperatur 20—25°. Zur Kost Suppen und etwas Gemüse. Nach 36 Stunden kühlen sich die Kranken ab, wechseln die Wäsche, nehmen am 3. Tage</p>	—	23

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>ein lauwarmes Bad und das Pulvis laxans (Calomel et Jalappe). Sollten nach dieser Cur noch einzelne Bläschen oder Pusteln zugegen sein, so werden sie mit der Nadel aufgestochen und mit einer Sublimatlösung (gr. i auf 3i aq. destill.) getupft. Nach drei Tagen erhalten die Kranken ganze Kost und werden entlassen.</p> <p>Contraindication. Kleine, schwächliche Kinder, grosse, ausgebreitete Geschwüre, Fieber (Typhen und Phthisen, Entzündungen etc.), bei welchen entweder dieselbe Methode, aber modificirt und milder (z. B. 6 — 12 Stunden) oder Schwefelleber- Waschungen und Bäder angewendet werden.</p> <p>NB. Mit dieser Methode wurden seit 1843 gegen 1800 Krätzkranke statt der früher üblichen Pfeufer'schen Methode (grüne Seife) geheilt.</p>		
<p>19. Unguentum contra Scabiem. (Helmerich.)</p> <p>Rp. Kali subcarbonici 3ii. Florum sulphuris 3ß. Axungiae porci 3ii.</p> <p>M. f. ungt. DS. Krätzsalbe.</p> <p>Diese Quantität wird in 4 Portionen getheilt, und jeden Morgen und Abend eine derselben zum Einreiben der afficirten Theile verwendet. Diese Helmerich'sche Salbe wird häufig in der dahiesigen Poliklinik angewendet,</p>	—	18
<p>20. Unguentum contra Scabiem secundum Wilkinsonson. (modific. ab Hebra.)</p> <p>Rp. Terrae cretosae 3iv. Sulphuris venalis Picis liquidae ana 3vi. Saponis domesticus Axungiae porci ana 3i.</p>	—	4 à 3i

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>M. f. ungt. DS. Krätzsalbe für 20 Individuen.</p> <p>Die Kranken erhalten, wenn sie unreinlich, ein Bad, und reiben sich dann nur an den Krätzstellen (meist blos an Händen und Füßen) mit einer kleinen Quantität dieser Salbe Morgens und Abends gehörig ein, legen sich zu Bette, und wiederholen 3 Tage hindurch diese Einreibungen, nehmen am 4. Tage ein Bad, und können entlassen werden, da die nach dem Absterben der Milbe etwa noch bestehenden Haut-Efflorescenzen entweder von selbst, oder durch einfache warme Wasserbäder heilen. Zimmertemperatur ist nicht erhöht, nur hüllt man die Kranken ausser des Leinentuches noch in wollene Decken ein. Zur Kost $\frac{1}{2}$ Portion. (Suppe, Gemüs, Fleisch, Brot.) — In Betreff der secundären, künstlichen Efflorescenzen fomentirt man die etwa vorkommenden rothen Knoten mit einer Kalicausticum - Solution 3i auf ig Wasser; die Geschwüre heilen durch einfache warme Wasserbäder, höchstens Schwefelbäder; die durch die Salbe künstlich erzeugten Ausschläge meist von selbst, oder durch kalte Umschläge, Douchen, Zinksalbe. (Diese Methode ist seit neuester Zeit im Julius-Hospital eingeführt.). —</p>		
<p>21. Unguentum Calomelanos compositum.</p> <p>Rp. Calomelanos Plumbi acetici ana ℥ii. Camphorae rasae gr. vi. Axungiae porci 3℔.</p> <p>M. f. ungt. DS. Salbe. Bei Hauttuberkeln, platten Tuberkeln als Resolvens.</p>	—	15
<p>22. Unguentum Calcariae chloratae cum Turpetho minerali.</p> <p>(Chevalier.)</p> <p>Rp. Calcariae chloratae 3iij. (Hydrargyri sulphurici oxydati 3ii.)</p>		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Olei amygdalarum dulcium (seu olivarum) 3vi. Axungiae porci 3ii. M. f. unguentum. Detur ad ollam. Sign. Salbe. Bei Psoriasis, Prurigo.</p>	—	34
<p>23. Unguentum Cedriae (Picis liquidae). Rp. Picis liquidae Axungiae porci ana 3ii. M. f. ungt. DS. Theersalbe, täglich 1mal die afficir- ten Stellen damit einzureiben, nach 6 Tagen ein Bad; und dabei innerlich zum Getränke Aqua Cedriae (picea.) Rp. Picis liquidae part. i. infunde cum Aquae fontanae part. ii—iv. Stet per dies ii, saepius terendo, defunde et in bene conclusis lagenis conserva. S. Theerwasser, täglich 1 Schoppen, steigend bis 2—4 Schoppen mit Milch oder Wein vermischt zu verbrauchen. Bei Psoriasis, Prurigo, Tinea, Eczema chronicum.</p>	—	19
<p>24. Unguentum Cedriae (Picis liquidae) com- positum. Rp. Picis liquidae Sulphuris depurati Axungiae porci ana 3iii. Cretae praeparatae 3ii. Liquoris ammonii sulphurati 3i. M. f. ungt. DS. Salbe. Bei Prurigo formicans. Die Knötchen werden zuerst aufgerieben, dann mit aromatischem Essig getupft und darauf obige Salbe ein- gerieben. Gleichzeitig kann damit der innerliche Ge-</p>	—	42

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
brauch der Fowler'schen Arseniksolution und der Plummer'schen Pillen verbunden werden. (Auch bei Porrigio favosa.) —		
25. Unguentum Cocculorum indicorum. Rp. Pulveris cocculorum indicorum ℥ii. Axungiae porci ℥i. M. f. ungt. DS. Salbe. Bei Prurigo (scutulata), Favus (figuratus).	—	11
26. Unguentum epilatorium (Pommade épilatoire, méthode épilatoire). (Mahon, Rayer.) Rp. Calcariae extinctae ℥ii. Natri subcarbonici ℥iii. Axungiae porci ℥ii. M. f. ungt. Bei Favus. Zuerst werden die Haare kurz abgeschnitten, die Krusten durch Kataplasmen erweicht und entfernt und der Kopf mit Seifenwasser gereinigt (4—5 Tage lang), dann alle zwei Tage diese Salbe an den Favus-Stellen eingerieben. Nach 14 Tagen streut man wöchentlich einige Finger voll von folgendem Pulver ein: Pulvis epilatorius. (Poudre épilatoire.) Rp. Pulveris carbonis vegetabilis ℥i. Calcariae extinctae ℥i. Kali subcarbonici ℥ii. M. f. pulvis. An den freien Tagen kämmt man die Haare mit einem engen, eingeöhlten Kämme durch, welche nun ohne Schmerzen ausfallen; nach 1—1½ Monat verstärkt man die Salbe und reibt sie noch ½—1 Monat lang ein, bis alle Röthe der Haut verschwunden ist.	—	17
	—	16

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>27. Unguentum cum Hydrargyro ammoniato-muriatico. (Rayer.)</p> <p>Rp. Mercurii praecipitati albi 3i. Axungiae porci 3i. M. f. ungt. DS. Salbe.</p> <p>Bei Gutta rosacea, Sycosis, wenn die entzündlichen Symptome gewichen sind.</p>	—	18
<p>28. Unguentum cum Hydrargyro jodato et bijodato. (siehe III. Hauptabtheilung.)</p> <p>Diese Salben werden angewendet bei Pityriasis, Psoriasis, Lupus.</p>		
<p>29. Unguentum cum Hydrargyro oxydato rubro et Camphora.</p> <p>Rp. Mercurii praecipitati rubri Camphorae tritae ana 3iβ. Cerae albae liquefactae 3iili. Butyri recentis 3iili. M. f. ungt. DS. Salbe.</p> <p>Bei Gutta rosacea, Sycosis, wenn die entzündlichen Symptome gewichen sind.</p>	—	38
<p>30. Unguentum Jodureti Sulphuris. (Biett.)</p> <p>Rp. Jodureti sulphuris ʒi—3β. Axungiae porci 3i. M. f. ungt. DS. Salbe.</p> <p>Bei Lupus, Herpes, Sycosis, Lichen. (syphilitischen) Haut-Tuberkeln; man beginnt mit ʒi Salbe einzureiben.</p>	—	17—21

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
31. Unguentum Picrotoxini. Rp. Picrotoxini gr. ii—iv. Axungiae porci 3ii. M. f. ungt. DS. Salbe. Wie bei ungt. coccul. indic.	—	22—38
32. Unguentum saponato-sulphuratum. (Biett.) Rp. Sulphuris depurati Saponis medicati ana 3ii. Solve saponem in aqua fontana q. s. sensim sensimque addendo sulphur. Statt dieser durch Sapo medic. etwas vertheuerteren Salbe wird meist die nächstfolgende Salbe angewendet.	—	52
33. Unguentum saponato-sulphuratum. Rp. Sulphuris depurati Saponis domestici albi pulverisati ana 3ii Axungiae porci 3/3. M. f. ungt. — DS. Schwefelsalbe, bei Impetigo Achor. — Die Haare werden abgeschnitten, die Krusten durch Kataplasmen, Chamillen-Fomentationen erweicht, und entfernt, hierauf die Salbe eingerieben; nebstbei wendet man fleissig die Seifenwaschungen an. Eine andere eben so häufig in Gebrauch gezogene Formel ist folgende: Kali carbonici 3/3. Sulphuris depurati 3i. Axungiae porci 3i. M. f. ungt. —	—	10
34. Unguentum sulphuratum cum Sapone viridi. Rp. Sulphuris depurati 3i.	—	11

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Saponis viridis $\mathfrak{z}\text{i}$. M. f. ungt. DS. Salbe. Bei Acne mentagra. Zuerst wird der Bart mit flach gekrümmter Scheere, dann die Krusten durch Kataplasmen entfernt; hierauf täglich mit dieser Salbe eingerieben; je am 3.—4. Tage Alles mit gewöhnlichem Seifenwasser gereinigt, zwischen- durch (wöchentlich 1mal) Kataplasmen gemacht, um die Haut geschmeidig zu erhalten. Curzeit 2—3 Wochen. — (Auch bei Favus kann diese Salbe versucht werden.)</p>	—	8
<p>35. Unguentum Zinci. Rp. Zinci oxydati $\mathfrak{z}\text{i}$—$\mathfrak{v}\text{iv}$. Axungiae porci $\mathfrak{z}\text{i}$. M. f. ungt. DS. Salbe. Bei Eczema chronic., nachdem die Krusten entfernt, Abends einzureiben. —</p> <p>Anmerkung. Die Formeln für Bäder siehe II. Hauptabtheilung, VII. Classe, welche ebenfalls zu Douchen verwendet werden.</p>	—	15—18

Anhang.

(V. Hauptabtheilung.)

C O S M E T I C A.



I. Classe.

Zahnmittel.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Zahnpulver.		
1. Pulvis dentifricius albus. Rp. Pulveris radiceis ireos flor. ℥ii . Oss. sepiæ ℥i . Aluminis crudi Cremoris tartari ana ℥ii . Boracis veneti ℥i . Olei caryophyllorum " citri ana gtt. vi. M. f. pulv. detur ad scatulam. S. Weisses Zahnpulver.	℥i —	12
2. Pulvis dentifricius niger. Rp. Pulveris carbonum tiliæ ℥ii . " herbae salviae ℥vi . " corticis chinae regiae ℥ii . Aluminis crudi Boracis veneti ana ℥i . Olei caryophyllorum gtt. viii. M. f. p. d. ad scatulam. S. Schwarzes Zahnpulver.	℥i —	12
3. Pulvis dentifricius ruber opt. Rp. Coccionellarum tritarum ℥i . Aluminis crudi pulv. ℥℥ . Tartari depurati ℥i℥ . Aq. fontan. q. s. ut fiat terendo electuarium, cui adde		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Boracis veneti Oss. sepiæ ana $\frac{3}{3}$. Pulveris rad. ireos flor. 3vi. Maeram cum aqua ad pultem dilue, tunc exsicca et pulveri adde Olei amygdalarum dulcium q. s. ($\frac{3}{3}$) ad colorem rubrum.</p> <p>D. ad scatulam. S. Rothes Zahnpulver.</p>	3i	16
Zahnpillen.		
4. Pilulae contra dolores dentium.		
<p>Rp. Opii puri gr. xviii. Extracti belladonnae Camphoræ tritæ ana gr. xii. Tincturæ de Para $\frac{3}{3}$. Olei cajeput. gtts. xx. Pulveris radice pyrethri q. s. ut fiat massa pilularum, e qua f. pil. pond. gr. i.</p> <p>Consp. pulvere caryophyllorum.</p> <p>D. ad vitrum. S. Zahnpillen. Eine Pille in den schmerzhaften Zahn zu legen.</p>	—	36
	2St.	1
5. Pilulae opiatae		
contra dolores dentium.		
<p>Rp. Opii pulverisati puri $\frac{3}{3}$. Extracti Opii aquosi $\frac{3}{3}$. Mucilaginis gummi arabici q. s. ut f. massa pilularum e qua form. pil. Nro. xxx.</p> <p>D. ad scatulam.</p> <p>S. Zahnpillen. Eine Pille in den schmerzhaften Zahn zu legen.</p>	—	24
	1St.	1

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>6. Electuarium dentifviciun.</p> <p>Rp. Pulveris radidis ireos florent. ℥ii. Coccionellarum pulv. ℥i. Tartari depurati Aluminis crudi ana ℥ii. Pulveris gummi res. myrrhae $\text{℥i}\beta$. " lapidum caneror. ℥iii. Spiritus cochleariae ℥i. Olei caryophyllorum $\text{℥}\beta$. Mellis rosarum q. s. ut fiat electuarium.</p> <p>D. ad ollam. S. Zahnlatwerge.</p>	℥i —	12
<p>Zahntincturen.</p> <p>7. Tinctura de Para. (Paraguay Roux.)</p> <p>Rp. Florum spilanthis oleracei ℥vii. Herbae inulae brittanicae ℥i ℥vi. Radidis pyrethri roman. ℥ii $\text{℥i}\beta$. Alcoholis (810% R.) ℥xx. Digere per dies sex, tunc exprime, filtra et serva in vitro probe clauso.</p> <p>S. Einige Tropfen hievon auf Baumwolle zu thun, und solche in den hohlen Zahn zu legen.</p>	℥i —	12
<p>8. Tinctura dentifricia contra dol. dent.</p> <p>Rp. Tinctur. de Para (Paraguay Roux) ℥i. " opii simplicis gttis. xv.</p> <p>MDS. Auf Baumwolle in den schmerzhaften Zahn zu legen.</p>	—	20

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>9. Tinctura dentifricia. (Herz.) (Zur Erhaltung der Zähne und Stärkung des Zahnfleisches.)</p> <p>Rp. Ligni guajac. Cort. cinnam. Caryophyll. arom. Sem. anis. stell. ana 3ii. Coccionell. trit. 3ß. Alcohol 3xvi.</p> <p>Digere per noct. filtr. et adde Ol. menth. pip. gtt. 48. ,, rosar. opt. n. 12. m. f. tinct.</p>	3i—	12
<p>10. Zahnkitt.</p> <p>Rp. Pulv. resinae mastichis " sandarac ana 3i. Aetheris sulfurici 3ii.</p> <p>D. S. In der hohlen Hand einige Tropfen davon mit Wasser zu vermischen, wo sich der Zahnkitt als harziges Klümpchen ausscheidet, oder auch auf Baumwolle getrüpfelt in den hohlen Zahn zu legen.</p>	—	20

II. Classe.

Haarmittel.

Formeln.		Taxe.	
		fl.	kr.
Unguenta pomadina.			
11. Unguentum pomadinum chinatum.			
Rp. Axungiae porci ablutae ℥ii.			
Cerae albae ℥ii.			
leni calore liquefactis et refrigeratis admisceo			
Extracti chinae frigide parati ℥i.			
Balsami peruviani ℥ii.			
Olei bergamottae			
„ citri ana gts. xx.			
M. f. ungt. D. S. Chinapomade.		℥i—	30
12. Unguentum pomadinum optimum.			
Rp. Medullae boum			
Axungiae porci ana ℥i/3.			
Olei olivarium opt. ℥i/3.			
leni calore liquefactis et iterum refrigeratis admisceo			
Balsami peruviani ℥i.			
Tincturae cantharidum ℥ii.			
Succi citri recent. expressi ℥i/3.			
Extracti chinae calide parati et in pauxillo			
aquae dest. soluti ℥iv.			
Olei lavandulae			
„ bergamottae ana ℥i.			
„ caryophyllorum gts. vi.			
„ naphae gts. iii.			
M. f. ungt. D.		℥i—	20

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>13. Macassar-Oel.</p> <p>Rp. Radicis alcanthae ℥ii. digere cum Olei olivarum ℥iii per dies tres, tunc exprime et colaturae adde Olei cinnamomi „ thymi ana gtts. x. „ citri „ bergamottae „ caryophyllorum ana ℥i.</p> <p>MDS. Haaröl.</p>	3i—	12
<p>Haarwaschmittel.</p> <p>14. Haarwaschwasser.</p> <p>Rp. Radicis bardanae ℥iv. Corticis chinae fusc. 3℔. „ quercus ℥ii. „ salicis ℥i.</p> <p>Coque aq. fontana q. s. per horam ad colaturam ℥xii et adde Vini optimi ℥ix. Spiritus lavendulae ℥i. Olei bergamottae Succi citri Balsami peruviani ana ℥iv.</p> <p>Misce et serva.</p> <p>Man wäscht alle Morgen einen Löffel voll mit Wasser gemischt auf den Haarboden ein.</p>	1	54
<p>15. Haarspiritus.</p> <p>Rp. Tincturae kino Balsami peruviani ana ℥ii. Tincturae cantharidum ℥i. Succi citri 3℔. Spiritus serpylli „ lavendulae ana ℥ii.</p> <p>Misce. D.</p> <p>Täglich einen Theelöffel mit Wasser vermischt am Morgen in den Haarboden einzureiben.</p>	—	45

III. Classe.

Handwaschmittel.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>16. Handwaschpulver.</p> <p>Rp. Saponis domestici ℥ix. Farinae tritici ℥iii. Pulveris iridis florentin. ℥ii. Kali carbonici depurati ℥ii. Olei bergamottae „ lavendulae „ citri ana ℥ii. Mixturae oleosae bals. 3i. M. f. pulv. D.</p> <p>Mit Wasser einen Theelöffel voll angemacht, zum Waschen der Hände.</p>	1 3i—	54 9
<p>17. Handwaschteig.</p> <p>Rp. Furfuris amygdalarum ℥x. Olei bergamottae „ lavendulae ana gtts. xv. „ caryophyllorum gtts. v. Aquae rosarum q. s. ut fiat pasta. D. ad ollam. —</p>	—	36
<p>18. Pomade bei aufgesprungener Haut.</p> <p>Rp. Cerae albae 3i℥. Cetacei 3ii. Olei amygdalarum 3i℥.</p>		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Olei olivarum \mathfrak{z} i. leni igne liquatis, agitatione perpetua admisce Aquae rosarum \mathfrak{z} i. Olei bergamottae Bals. peruviani ana $3\mathfrak{z}$. M. f. ungt. D. S. Hautpomade.	—	51

Inhalt.

I. Hauptabtheilung.

Formeln zum innern Gebrauch.

		Seite
	I. Classe. Pulveres	1
1.	Pulvis Aconitini	—
2.	„ aërophorus	—
3.	„ „ Seidlitzensis	—
4.	„ alterans Plumeri	2
5.	„ antepilepticus Marchionis	—
6.	„ „ Hufelandi	—
7.	„ „ Ragoloi	—
8.	„ antihelmincticus	3
9.	„ aromaticus	—
10.	„ Berberini	—
11.	„ Camphorae	—
12.	„ Castorei moscowitici	4
13.	„ Chinae compositus	—
14.	„ Chinini sulfurici	—
15.	„ Chinini sulfurici	—
16.	„ Chinini valerianici	—
17.	„ Doweri compositus	5
18.	„ Doweri simplex	—
19.	„ emeticus	—
20.	„ Ferri alcoholisati	—
21.	„ „ carbonici	6
22.	„ „ hydrocyanici	—
23.	„ „ phosphorici	—

	Seite
24. Pulvis florum Benzoes	6
25. „ foliorum Uvae Ursi kalinus	—
26. „ herbae Sabinae cum Borace	7
27. „ Indigi	—
28. „ Kermetis mineralis cum Moscho	—
29. „ Lactucarii germanici	—
30. „ laxans	—
31. „ Limonade	8
32. „ Liquiritiae compositus	—
33. „ Magisterii Bismuthi	—
34. „ Morphii acetici	—
35. „ „ cum Agarico	—
36. „ cum Moscho	9
37. „ cum oleo Crotonis Tiglii	—
38. „ Opii	—
39. „ Plumbi acetici opiatius	—
40. „ pro infantibus sec. Hufeland	—
41. „ resolvens	10
42. „ Rhei compositus seu stomachicus	—
43. „ Salicini	—
44. „ Santonini	—
45. „ Sulfuris aurati comp.	—
46. „ Secalis cornuti	11
47. „ Sellii	—
48. „ Strychnini	—
49. „ Tannini opiatius	—
50. „ temperans	12
51. „ Zinci oxydati albi	—
52. „ „ hydrocyanici	—
53. „ „ valerianici	—
II. Classe. Species	13
54. Species antihypotipicae	—
55. „ diureticae Rombergi	—
56. „ lignorum	—
57. „ Loweri	14

	Seite
58. Species nervinae	14
59. „ pectorales cum fructibus	—
60. „ „ ordin.	15
61. „ pro infantibus	—
III. Classe. Pilulae	16
62. Pilulae adstringentes	—
63. „ aloëticae	—
64. „ „ compositae	—
65. „ Ammoniaci (gummi res.) compos.	17
66. „ anglicae	—
67. „ ex Argento nitrico fuso	—
68. „ arsenicales	18
69. „ ex Asa foetida	—
70. „ e balsamo Copaivae	—
71. „ e Brucino	—
72. „ e Camphora cum Opio	—
73. „ Colocynthid. comp.	19
74. „ e Conio maculato	—
75. „ e Creosoto	—
76. „ extract. Cynae (antihelminth.)	—
77. „ ex Ergotino	20
78. „ e Fell. tauri	—
79. „ e Ferro et Ammonio muriatico	—
80. „ „ „ carbonico saccharato	—
81. „ „ „ phosphorico	21
82. „ „ „ puro limato	—
83. „ „ „ sulfurico	—
84. „ ferruginosae compositae	—
85. „ extract. Filicis maris aeth.	22
86. „ e res. Guajaci	—
87. „ Heimii	—
88. „ jalapinae	—
89. „ mercuriales Dzondi	23
90. „ „ in nosocomio Julii usitatae	—
91. „ „ „ jodat.	—

	Seite
92. Pilulae mercuriales purgantes	23
93. „ e Myrrha comp.	—
94. „ extract. Nucis vomicae	—
95. „ ex oleo Crotonis Tigl. comp.	24
96. „ opiatæ	—
97. „ e Quassia	—
98. „ e Rheo	—
99. „ Rufi	25
100. „ e Salicino	—
101. „ terebinthinatae	—
102. „ ex Urea nitrica	—
 IV. Classe. Electuaria	 26
103. Electuarium antihelminthicum	—
104. „ antihydopicum	—
105. „ e Senna (lenitivum)	—
106. „ mundificans Werlhofii	27
107. „ purgans	—
108. „ resolvens	—
 V. Classe. Gelatinae	 28
109. Gelatina Cornu Cervi	—
110. „ lichenis Carragheen	—
111. „ „ islandici	—
112. „ radice Salep	29
 VI. Classe. Linctus	 30
113. Linctus communis	—
114. „ emeticus communis	—
115. „ „ Hufelandi	—
116. „ expectorans	—
117. „ oleoso - gummosus	31
118. „ opiatus	—
119. „ stibiato - opiatus (de Laenec)	—
120. „ e Borace (Litus oris)	—

VII. Classe. Guttulae	32
121. Guttulae acidulae (1. 2.)	—
122. „ ex acido hydrocyanico	—
123. „ antiarthriticae (1. 2. 3.)	33
124. „ antihæmorrhagicae	—
125. „ ex extracto Ferri pomati	—
126. „ e Ferro jodato	—
127. „ „ lactico	34
128. „ „ Morphio acetico	—
129. „ nervinae	—
130. „ terebinthinae (contr. Cholelithiasin)	—
VIII. Classe. 1. Abtheilung. Emulsiones	35
a. Emulsiones verae	—
131. Emulsio amygdalina pro mixtura	—
132. „ „ „ potu	—
133. „ „ arabica	—
134. „ „ camphorata	—
135. „ „ chinata	36
136. „ „ ferrata	—
137. „ „ opiata	—
138. „ „ opiato-nitrosa	—
139. „ „ salina	37
140. „ seminis Cannabis	—
b. Pseudo-Emulsiones	—
141. Mixtura oleosa-gummosa	—
142. „ gummosa balsami peruviani	—
143. „ „ „ Copaivae	38
144. „ terebinthinata (Emuls. terebinth.)	—
VIII. Classe. 2. Abtheilung. Decocta	39
145. Decoctum album	—
146. „ Althæae cum Senega	—
147. „ Chinae	—
148. „ Colombo cum Salep	—
149. „ Graminis cum Oxymelle	40

	Seite
150. Decoctum corticis radicis Granati	40
151. „ Guajaci	—
152. „ Carragheen	—
153. „ Lichenis islandici cum Salep	41
154. „ Ratanhae	—
155. „ solvens	—
156. „ Tamarindorum	—
157. „ „ cum acido phosphorico	42
VIII. Classe. 3. Abtheilung. Infusa	43
158. Infusum Arnicae florum	—
} „ rad. Angelicae	—
159. } „ „ Caryophyllat.	—
} „ „ Calam. arom.	—
} „ „ Valerian.	—
160. „ aromaticum acidum	—
161. „ Chinae frigide paratum	—
162. „ Ipecacuanhae	44
163. „ Secale cornuti	—
164. „ Sennae compositum	—
165. Potio laxans (e Senna)	—
166. Infusum Uvae Ursi cum Thea	45
VIII. Classe. 4. Abtheilung. Mixturae et Solutiones	46
167. Mixtura antihydrica Frankii	—
168. „ chlorata	—
169. „ diaphoretica	—
170. „ Rhei composita	47
171. „ „ salina	—
172. „ Riveri (potio Riveri)	—
173. „ salina	—
174. „ „ cum oleo Crotonis	48
175. Solutio Ammonii phosphorici	—
176. „ Ferri sulfurici	—
177. „ Chinini sulfurici	49
178. „ gummosa	—

	Seite
179. Solutio gummosa campherata	49
180. „ Kali hydrojodinici	—
181. „ nitrosa	50
182. „ Tartari emetici in refracta dosi	—
183. „ „ „ in plena dosi	—
IX. Classe. Sera medicata	51
184. Serum Lactis acetosum	—
185. „ „ tartarisatum edulceratum	—
186. „ „ aluminatum	—
187. „ „ tamarindinatum	52
188. „ „ gramineum	—
189. „ „ herbaceum	—
X. Classe. Gargarismata	53
190. Gargarisma chlorata	—
191. „ e Cicuta	—
192. „ emolliens	—
193. „ ex herba Cochleariae	—
194. „ „ „ Salviae	54
XI. Classe. Clysmata	55
195. Clysma commune	—
196. „ eccoproticum	—
197. „ emolliens	—
198. „ ex Aceto vini	—
199. „ „ Asa foetida	56
200. „ „ herba Nicotianae Tabaci	—
201. „ „ Oleo Terebinthinae	—
202. „ „ Opio	—
203. „ e Tartaro emetico	57
204. „ viscerale Kaempfi	—
II. Hauptabtheilung.	59
Formeln zum äussern Gebrauch.	
I. Abtheilung	61
I. Species	—
1. Species aromaticae	—

	Seite
2. Species emollientes herbaceae	61
3. „ „ pulv.	—
4. „ narcoticae	62
5. „ sopientes	—
6. Lana aromatica	—
II. Fomentationes (et Fumigationes)	63
7. Fomentatio Calcariae chloratae	—
8. „ chlorata	—
9. „ frigida Schmuckeri	—
10. „ Heisteri	—
11. Aqua Goulardi	64
12. „ phagadaenica fortior	—
13. „ „ nigra (mitis)	—
14. „ vulneraria Thedenii	—
15. Decoctum Fuliginis	64
16. Fumigatio Chlori	65
III. Caustica	—
17. Liquor Bellostii	—
18. Pulvis causticus Cosmi	—
IV. Linimenta	66
19. Linimentum Calcis	—
20. „ phosphoratum (oleum phosph.)	—
21. „ „ camphoratum	—
22. „ volatile	—
23. „ „ camphoratum	—
V. Unguenta	67
24. Ceratum simplex	—
25. „ opiatum	—
26. „ Saturni (plumbicum)	—
27. Unguentum ad perniones	—
28. „ anodynum	68
29. „ de Ferrear	—
30. „ emolliens	—
31. „ „ camphoratum	—
32. „ Haenii (contra decubitus)	69
33. „ Kali hydrojodini	—

	Seite
34. Unguentum Kali hydrojodinici cum Jodo puro . . .	69
35. „ nervinum . . .	—
36. „ Plumbi tannici Autenriethii (contra de- cubitum) . . .	70
37. „ Plumbi tannici Weikardii . . .	—
38. „ Tartari emetici (Autenrieth) . . .	—
VI. Emplastra . . .	71
39. Emplastrum adhaesivum . . .	—
40. „ ad perniones . . .	—
41. „ aromaticum (stomachic.) . . .	—
42. „ emolliens . . .	72
43. „ rubefaciens . . .	—
44. „ stibiatum . . .	—
VII. Balnea . . .	73
I. Balnea cum Sapone domestico . . .	—
II. „ „ Furfure tritici . . .	—
III. „ „ Maltho hordei . . .	—
IV. „ „ Glutine animali . . .	—
V. „ salina . . .	—
a) „ cum Natro muriatico . . .	—
b) „ „ Sale de Orb . . .	74
c) „ „ „ Creuznach . . .	—
d) „ „ „ marino . . .	—
VI. „ marina artificial. sec. Hufeland . . .	—
VII. „ sulfurata . . .	—
a) „ „ alcalina . . .	—
b) „ „ calcarea . . .	75
c) Bareges-Bäder . . .	—
VIII. Balnea jodata . . .	—
IX. „ cum Mercurio sublimato corrosivo . . .	—
X. „ ferrata a. b. . .	—
XI. „ cum Acidis a. b. . .	76
XII. „ „ Kali caustico . . .	—
XIII. „ adstringentia . . .	—
XIV. „ aromatica . . .	—
XV. „ narcotica . . .	77

II. Abtheilung	Seite
Formeln der ophthalmiatischen Klinik.	78
VIII. Collyria	—
Aqua Conradi	—
„ coerulea	—
Collyrium ophthalmicum	—
Praeparatio lapidis divini St. Yvesii	79
Collyrium cum liquore Bati	—
Praeparatio liquoris Bati	—
IX. Unguenta ophthalmica	—
Unguentum Belladonnae	—
„ Boli albae	80
„ ophthalmicum Janini	—
„ „ rubrum (Beerii)	—
„ opiatum cum Mercurio	—
III. Hauptabtheilung.	81
Formeln der Syphilido-Klinik.	
I. Unterabtheilung.	
Formeln zum innern Gebrauch.	
Erster Abschnitt.	
Für nicht virulente Affectionen.	
I. Classe. Balsamum Copaivae et Cubebae	83
1. Balsamum Copaivae	—
a) Balsamum Copaivae	—
b) Emulsio balsami Copaivae	—
c) Mixtura Choparti	—
d) „ Delpechi	84
e) Balsamum Copaivae cum oleo terebinthinae	—
f) „ „ „ vino hispanico	—
2. Cubebae	—

	Seite
a) Pulvis Cubeborum	84
b) „ „ ferruginosus (Ricord)	85
c) Pilulae et boli Cubeborum cum balsamo Copaivae	—
d) Electuarium Cubeborum	—
 II. Classe. Clysmata	 86
Clyisma cum Argento nitrico	—
„ e balsamo Copaivae	—
 III. Classe. Injectiones	 87
A. Für die Harnröhre der Männer	—
1. Injectiones emollientes et anodynae	—
Injectio cum decocto capiti Papaveris albi	—
„ „ emulsione Papaveris albi	—
„ „ narcotica	—
2. Injectiones adstringentes	88
Injectio cum Alumine	—
„ „ Argento nitrico	—
„ „ „ „ composita	—
„ „ Chinino sulfurico	—
„ „ Cupro sulfurico	89
„ „ Ferro iodato	—
„ „ Hydrargyro muriatico corrosivo	—
„ „ Plumbo acetico	—
„ „ tinctura Jodi	—
„ „ vinosa	90
„ „ cum Tannino	—
„ „ cum Zinco	—
3. Injectiones causticae	91
Injectio caustica cum Argento nitrico	—
„ „ „ „ Hydrargyro nitrico	—
B. Einspritzungen für die Scheide	—
1. Injectiones emollientes et anodynae	—
Injectio anodyna	—
„ „ emolliens	92
„ „ cum decocto capiti Papaveris albi	—

	Seite
2. Injectiones adstringentes	92
Injectio cum Acido nitrico	—
„ „ Alumine crudo	—
„ „ aqua Calcis	—
„ „ „ „ et Catechu	93
„ „ „ chlorata	—
„ „ Argento nitrico	—
„ „ Calcaria chlorata	—
„ „ decocto corticis Quercus	—
„ „ infuso herbae Cicutae	94
„ „ Hydrargyro muriatico corrosivo	—
„ „ Plumbo acetico	—
„ „ decocto Ratanhiae	—
„ „ Tannino	—
„ „ Zinco sulfurico	95
C. Injectiones für die Gebärmutter	—
Injectiones adstringentes	—
Injectio cum Argento nitrico	—
„ „ Plumbo acetico crystallisato	—
Zweiter Abschnitt.	97
Formeln zum innern Gebrauch für virulente Affectionen.	
I. Classe. Pulveres	99
Pulvis cum Mercurio praecipitato rubro	—
„ „ „ „ „ et Antimo- nio sulfurato	—
II. Classe. Pilulae	100
Pilulae Calomelanos cum Cicuta	—
„ mercuriales Dzondi	—
„ „ in nosocomio Julii usitatae	101
„ opiatae camphoratae	—
„ Jodureti Hydrargyri (Ricord)	102
III. Classe. Roob et Syrupi	103
Roob antisymphiliticus (L'affecteur)	—

	Seite
Formula in nosocomio Juliano usitata	103
Roob seu Syrupus de Cuisinier	104
Syrupus seu Roob ferruginosus	105
„ ferruginosus cum Ratanhia	—
„ sudorificus	—

IV. Classe. Decocta, Infusa, Solutiones 106

Decoctum Felzii a.	—
„ „ b. einfachere Formel	—
„ Pollini	—
„ Sassaparillae forte seu antisyphiliticum forte	107
„ Sassaparillae tenue seu antisyphiliticum tenue	—
„ Sassaparillae cum cortice Mezerei	108
„ sudorificum	—
„ Zittmanni fortius	—
„ „ mitius	109
Infusum Sassaparillae	110
Liquor Hydrargyri muriatici corrosiv.	—

V. Classe. Gargarismata 111

Gargarisma cum Acido muriatico	—
„ „ Alumine crudo	—
„ „ cortice Chinae rubrae	—
„ „ Kali hydrojodico	112
„ „ Mercurio sublimato corros.	—

II. Unterabtheilung. 113

Formeln der Syphilido-Klinik zum äussern Gebrauch. —

I. Classe. Species et Fomentationes 115

Species. vide II. Hauptabtheilung I. Cl.	—
Fomentatio chlorata	—
„ cum Calcareo chlorata	—

	Seite
Fomentatio jodinica (Ricord)	115
„ cum Natrio chlorato	—
„ opiata	116
„ „ composita	—
„ Zinci muriatici	—
Vinum aromaticum	117
„ „ opiatum	—
„ „ cum Tannino	—
II. Classe. Caustica	118
Acidum nitricum	—
Pasta viennensis	—
Solutio Cupri sulfurici	—
„ concentrata Mercurii sublimati corrosivi	119
„ Plenki	—
„ „ (Einfachere Formel)	—
III. Classe. Unguenta	120
Unguentum Belladonnae	—
„ digestivum opiatum	—
„ cum Hydrargyro cyanato	—
„ „ „ jodato	—
„ „ „ jodureto	121
„ „ „ muriatico corrosivo	—
„ „ „ cum Opio	—
„ „ „ nitrico et Arsenico	—
„ Hydrargyri puri	122
„ „ opiatum	—
„ cum Hydrargyro oxydato rubro	—
„ „ „ phosph. oxydulato	—
„ opiatum cum Calomel	123
„ cum Plumbo jodato	—
Mel Hydrargyri protojodureti	—
Linimentum chloratum	—
IV. Classe. Emplastra	124
Emplastrum Cicutae cum Plumbo jodato	—

	Seite
Emplastrum Hydrargyri iodatum	124
„ mercuriale de Vigo	—
Einfachere Formel (Julius Hospital)	125

IV. Hauptabtheilung. 127

Formeln für Hautkrankheiten.

Interna 129

I. Classe. Pilulae —

1. Pilulae arsenicales —
2. „ cum Ferro arsenico oxydulato —
3. „ „ unguento Hydrargyri 130

II. Classe. Solutiones 131

4. Solutio Ammonii arsenicici —
5. Liquor arsenicalis Pearsonii —
6. Solutio arsenicalis Fowleri —
7. „ extracti foliorum Juglandis regiae —

Externa 132

I. Classe. Fomentationes et Lotiones —

8. Aqua Belli —
9. Lotio alcalinica —
10. „ Barlow —
11. „ exsiccans 133
12. „ Gowlandi —
13. „ hydrocyanica cum Plumbo acetico —

II. Classe. Caustica 134

14. Acidum nitricum —
15. Pasta cum Chloreto Zinci —
16. Solutio Kali caustici 135

III. Classe. Unguenta 136

17. Unguentum alkalanicum , —

	Seite
Fomentatio jodinica (Ricord)	115
„ cum Natrio chlorato	—
„ opiata	116
„ „ composita	—
„ Zinci muriatici	—
Vinum aromaticum	117
„ „ opiatum	—
„ „ cum Tannino	—
II. Classe. Caustica	118
Acidum nitricum	—
Pasta viennensis	—
Solutio Cupri sulfurici	—
„ concentrata Mercurii sublimati corrosivi	119
„ Plenki	—
„ „ (Einfachere Formel)	—
III. Classe. Unguenta	120
Unguentum Belladonnae	—
„ digestivum opiatum	—
„ cum Hydrargyro cyanato	—
„ „ „ jodato	—
„ „ „ jodureto	121
„ „ „ muriatico corrosivo	—
„ „ „ cum Opio	—
„ „ „ nitrico et Arsenico	—
„ Hydrargyri puri	122
„ „ opiatum	—
„ cum Hydrargyro oxydato rubro	—
„ „ „ phosph. oxydulato	—
„ opiatum cum Calomel	123
„ cum Plumbo jodato	—
Mel Hydrargyri protojodureti	—
Linimentum chloratum	—
IV. Classe. Emplastra	124
Emplastrum Cicutae cum Plumbo jodato	—

	Seite
Emplastrum Hydrargyri iodatum	124
„ mercuriale de Vigo	—
Einfachere Formel (Julius Hospital)	125

IV. Hauptabtheilung. 127

Formeln für Hautkrankheiten.

Interna 129

I. Classe. Pilulae —

1. **Pilulae arsenicales —**
2. „ **cum Ferro arsenico oxydulato —**
3. „ „ **unguento Hydrargyri 130**

II. Classe. Solutiones 131

4. **Solutio Ammonii arsenicici —**
5. **Liquor arsenicalis Pearsonii —**
6. **Solutio arsenicalis Fowleri —**
7. „ **extracti foliorum Juglandis regiae —**

Externa 132

I. Classe. Fomentationes et Lotiones —

8. **Aqua Belli —**
9. **Lotio alcalinica —**
10. „ **Barlow —**
11. „ **exsiccans 133**
12. „ **Gowlandi —**
13. „ **hydrocyanica cum Plumbo acetico —**

II. Classe. Caustica 134

14. **Acidum nitricum —**
15. **Pasta cum Chloreto Zinci —**
16. **Solutio Kali caustici 135**

III. Classe. Unguenta 136

17. **Unguentum alkalanicum , —**

	Seite
18. Unguentum anglicum contra Scabiem	136
19. „ contra Scabiem (Helmerich)	137
20. „ „ secund. Wilkinson	—
21. „ Calomelanos compositum	138
22. „ Calcariae chloratae cum Turpetho minerali	—
23. „ Cedriae (Picis liquidae)	139
24. „ „ („ „) compositum	—
25. „ Cocculorum indicorum	140
26. „ epilatorium (Pommade épilatoire)	—
27. „ cum Hydrargyro ammoniato-muriatico	141
28. „ „ jodato et bijodato	—
29. „ „ oxydato rubro et Camphora	—
30. „ Jodureti Sulphuris	—
31. „ Picrotoxini	142
32. „ saponato-sulphuratum (Bielt)	—
33. „ saponato-sulphuratum	—
34. „ sulphuratum cum Sapone viridi	—
35. „ Zinci	143

Anhang.

145

(V. Hauptabtheilung.)

Cosmetica.

I. Classe. Zahnmittel 147

Zahnpulver.

1. Pulvis dentifricius albus	—
2. „ „ niger	—
3. „ „ ruber opt.	—

Zahnpillen.

4. Pilulae contra dolores dentium	148
5. „ opiatae	—
6. Electuarium dentifricium	149

Inhalt.

171

Seite

Zahntincturen.

7. Tinctura de Para (Paraguay Roux)	149
8. „ dentifricia contra dol. dent.	—
9. „ dentifricia (Herz)	150
10. Zahnkitt	—

II. Classe. Haarmittel 151

Unguenta pomadina.

11. Unguentum pomadinum chinatum	—
12. „ „ optimum	—
13. Macassar - Oel	152

Haarwaschmittel.

14. Haarwaschwasser	—
15. Haarspiritus	—

III. Classe. Handwaschmittel 153

16. Handwaschpulver	—
17. Handwaschteig	—
18. Pomade bei aufgesprungener Haut	—

Register.

A.

Acetum Saturni S. 67.
— Vini 56. 63.
Acidum benzoicum 6.
— hydrocyanicum 32. 133.
— muriaticum 111.
— nitricum 92. 118. 134.
— phosphoricum 32. 42.
— tartaricum 1. 8.
Aconitin 1.
Aconitum 93.
Aerugo 78.
Aether aceticus 46.
— sulfuricus 34. 119. 150.
Agaricus 8.
Albumen ovi 38. 69.
Aloë 16.
Althaea 39.
Alumen 50. 88. 92. 111. 119.
Ammoniacum gummi res. 17.
Ammonium aceticum 46.
— arsenicicum 131.
— phosphoricum 48.
Amygdalae amarae et dulces 35.
36. 37.
Amygdalin 32.
Angelica 43.
Antimonium crudum 106. 107.
— sulfuratum 99.

Aqua Belli S. 132.
— Calcis 66. 92. 93.
— chlorata 46. 53. 63. 93.
115. 123.
— coerulea 78.
— Conradi 78.
— Goulardi veg. min. 64.
— Laurocerasi 32.
— laxativa Viennensis 44.
— phagadaenica fort. 64.
— — nigra 64.
— picea 139.
— vulneraria Theden. 64.
Argentum nitricum 17. 86. 88.
91. 93. 95.
Arnica 43.
Arsenicum 18. 65. 121. 129. 131.
Asa foetida 17. 18. 56.
Avena 14.

B.

Baccae Juniperi 13.
Balnea 73.
— cum acidis 76.
— adstringentia 76.
— aromatica 76.
— Bareges 75.
— cum Furf. tritic. 73.
— ferrata 75. 76.

- Balnea c. Glutin. anim. S. 73.**
 — jodata 75.
 — c. Kali caustico 76.
 — c. Maltho hordei 73.
 — marin. artif. s. Huf. 74.
 — c. Merc. subl. corros. 75.
 — narcotica 77.
 — salina 73.
 — c. Sapone domest. 73.
 — sulfurata 74. 75.
Balsamum Copaivae 18. 38. 83.
 — 84. 86.
 — peruvianum 37. 67. 154.
 — 152. 151.
Bardana 13.
Belladonna 62. 79. 120.
Benzoe 6.
Berberin 3.
Bilis tauri 20.
Bismuthum 8.
Boletus Laricis 8.
Bolus alba 80.
 — armena 63. 80.
Borax 7. 11. 31. 54. 147. 148.
Brucinum 18.
C.
Calamus aromaticus 43.
Calcaria chlorata 63. 138. 93.
 — extincta 140.
 — sulfurata 75.
Calomel 23. 100. 123. 138.
Calx viva 118.
Camphora 3. 18. 35. 49. 62.
 — 66. 68. 69. 101. 119.
Cannabis 37.
Carbo vegetabilis 140. 147.
Carduus benedictus S. 47. 22.
 — 23.
Caricae 14.
Carex arenaria 13. 103.
Carragheen 28. 40.
Caryophyllata (radix) 43.
Castoreum moscowitic. 4.
Catechu 93.
Caustica 65. 118. 134.
Cedria 139.
Cerata 67.
China (cortex) 4. 36. 39. 103.
 — 43. 111. 151.
 — nodosa (radix) 103. 108.
Chininum sulfuricum 4. 49. 88.
 — valerianicum 4.
Chlor (gasiform.) 65.
 — (aqua chlori) 46. 53.
 — 63. 93. 115. 123.
Cichoreum 41. 52.
Cicuta 19. 53. 62. 94. 100.
 — 116. 124.
Cinnabaris factit. 65. 108.
Cinnamomum 3. 11.
Clysmata 55.
Clyisma ex Aceto vini 55.
 — commune 55.
 — eccoproiticum 55.
 — emolliens 55.
 — viscerale Kaempf. 57.
Cocculi indici 140.
Cochlearia 53.
Colchicum autumnale 32. 33.
Collyria 78.
Colocynthides 19.
Colombo 4. 39.
Conium maculatum 17. 19.

Copaiva S. 18. 38. 83. 84. 86.
 Cornu Cervi 15. 28. 29.
 Cosmetica 147.
 Cremor tartari 11. 26. 27. 51.
 Creosot 19.
 Crocus sativus 17.
 Cubebae 84. 85.
 Cuprum sulfuricum 89. 118.
 Cynae semen 19. 26.

D.

Dactyli 14.
 Decocto-infusa 45.
 Decoctum album. 39.
 — antisiphiliticum forte et
 tenue 107.
 — Felzii 106.
 — Pollini 106.
 — resolvens 41.
 — sudorificum (Parment.)
 108.
 — Zittmanni fortius 108.
 — — mitius 109.
 Deuterojoduret. Hydrarg. 120.
 Dictamnus albus 2.
 Digitalis 10.
 Dulcamara 13. 107.

E.

Electuarium antihelm. S. 26.
 — antihydopic. 26.
 — dentifricium 149.
 — lenitivum 26.
 — mundif. Werlhof. 27.
 — purgans 27.
 — resolvens 27.
 Elixirium acid. Hall. 33. 43.

Emplastra S. 71. 124.
 Emplastrum adhaesivum 71.
 — aromatic. seu stomachi-
 cum 71.
 — Cicutæ cum Plumbo jo-
 dato 124.
 — emolliens 72.
 — Hydrarg. jodat. 124.
 — mercuriale de Vigo 124.
 — ad pernion. 71.
 — rubefaciens 72.
 — stibiaturum 72.

Emulsiones 35.

Emulsio amygdalina pro mix-
 tura 35.
 — pro potu 35.
 — arabica 35.
 — camphorata 35.
 — chinata 36.
 — ferrata 36.
 — salina 37.

Ergotinum 20.

F.

Fel Tauri 20.
 Ferrum alcoholisat. 5.
 — arsenicicum 129.
 — carbonicum 6. 20. 105.
 — hydrocyanicum 6.
 — jodatum 33. 89. 105.
 — lacticum 23. 34.
 — oxydat. hydrat. 36.
 — phosphoricum 6. 21.
 — pomatum 33.
 — purum limatum 21.
 — sulfuricum 21. 48.
 Filix mas 22.

- Flavedo cort. Aurant. S. 10. 43. Gummi resin. Asae foetid. S. 17.
 Flores Benzoes 6. 18. 56.
 — salis Ammoniaci martial. — — Guajaci 22.
 20. — — Guttae 22.
 — Sulfuris vide Sulfur. — — Myrrhae 23. 63.
 Folia Aurantiorum 2. 14. Guttulae 32.
 — Sennae 8. 26. 27. 44. — acidulae 32.
 105. 107. 108. — antiarthriticae 32.
 — Uvae Ursi 6. — antihaemorrhag. 33.
 Fomentationes et Fumigationes — contra Cholelithias. 34.
 63. 115. 132. — nervinae 34.
 Fomentatio frig. Schmuckeri 63.
 — Heisteri 63.
 Fuligo splendens 64.
 Furfur Triticum 73.

G.

- Gargarismata 53. 111.
 Gargarisma adstringens 54.
 — chloratum 53.
 — c. Cicuta 53.
 — emolliens 53.
 — c. herb. Cochlear. 53.
 Gelatina Cornu Cervi 28.
 — lich. Carragh. 28.
 — — islandici 28.
 — rad. Salep. 29.
 Geum urbanum vide Caryophyllata.
 Globuli martiales 75.
 Gluten animale 73.
 Gramen (rad.) 40. 41. 52.
 Granatum (rad.) 40.
 Guajacum 13. 22. 27. 40. 103.
 105. 107. 108.
 Gummi arabicum 49.
 — resin, Ammoniac, 17. 25.

H.

- Haarmittel 151.
 Haarspiritus 152.
 Haarwaschwasser 152.
 Handwaschmittel 153.
 Handwaschpulver 153.
 Handwaschteig 153.
 Hepar sulfuris alcalin. 74. 132.
 — — calcareum 75.
 Hordeum mundatum 14. 15.
 Hyoscyamus (sem.) 37. 62.
 Hydrargyrum ammon. muriat.
 80. 141.
 — cyanatum 120.
 — jodatum 120. 124.
 — joduretum 120.
 — muriat. corrosiv. 94.
 110. 119. 121.
 — nitricum 91. 121.
 — oxydatum rubrum 80.
 99. 122. 141.
 — protojoduretum 123.
 — purum 122.
 — sulfuric. oxydat. 138.

J.

- Jalappa S. 7. 22. 26. 27.
 Ichthyocolla 106.
 Indigo 7.
 Infusa 43.
 Infusum aromat. acid. 43.
 — Chinae fr. par. 43.
 Injectiones 87.
 — adstringentes 88. 92.
 — causticae 91.
 — emollientes et anodynae 87. 91. 92.
 — narcoticae 87.
 Jod 69. 75. 89. 115.
 Jodkalium 49. 69.
 Joduretum Hydrargyri 102.
 — Sulfuris 141.
 Ipecacuanha 5. 30. 44.
 Iris florentina 147.
 Juglans regia 106. 131.
 Juniperus communis (baccæ) 13.
 — — (roob.) 26.
 — Sabina 7.

K.

- Kali aceticum 46.
 — carbonicum 6.
 — causticum 76. 132. 135.
 — hydrojodincum 49.
 — nitricum 12. 36. 50. 63.
 — subcarbonicum 6. 136.
 — sulfuratum 74. 132.
 — sulfuricum 10. 26. 27.
 — tartaric. acidul. vid. Crem. tart.
 — tartarisatum vid. Tart. tart.
 Kermes mineralis 7.

L.

- Lactucarium german. S. 7.
 Lana aromatica 62.
 Lapides Cancrorum 2.
 Lapis divinus 78.
 — infernalis vide Argentum nitricum.
 Laudanum liquid. Syd. 33. 56. 116. 117.
 Levisticum (rad.) 13.
 Lichen Carragheen 28. 40.
 — islandicus 28. 41.
 Lignum Guajaci vide Guajacum.
 Limatura Ferri vide Ferrum.
 Linctus e Borace 31.
 — communis 30.
 — emeticus 30.
 — — Hufeland 39.
 — expectorans 30.
 — oleoso-gummosus 31.
 — opiatu 31.
 — stibiato-opiatu (deLaennec) 31.
 Linimentum Calcis 66.
 — volatile 66.
 — — camph. 66.
 — phosphorat. 66.
 Linum (sem.) 61.
 — (oleum) 55. 66.
 Liquiritia 8.
 Liquor arsenicalis Pearsonii 131.
 — Bati 79.
 — Bellostii 65.
 — Swietenis 110.
 Lithargyrum 63.
 Litus oris (e Borace) 31.

Lotio alcalinica S. 132.

- Barlow 132.
- exsiccans 132.
- Gowlandi 133.
- hydrocyanica cum Plum-
bo acetico 133.

M.

Macassar-Oel 152.

Magisterium Bismuthi 8.

Magnesia sulfurica 47. 48.
— carbonica (alba) 2. 9.
10. 11.

Malthum Hordei 73.

Manganum hyperoxydat. 65.

Manna 44.

Mastix vide Gg. res. Mastichis.

Mel protojureti Hydrargyri 123.

Mercurius dulcis vide Calomel.

- praecip. alb. 80. 141.
- — ruber 80. 99.
122. 141.

- sublimat. corrosiv. 75.
89. 119. 133.

Mezereum 108.

Mixturae 46.

Mixtura antihydrop. Frankii 46.

- Choparti 83.
- Delpeschi 84.
- diaphoretica 46.
- Riveri 47.

Morphium aceticum 8. 34.

Moschus 7. 9.

Myrrha vide Gg. res. Myrrhae.

N.

**Natrium chloratum (seu Na-
trum muriatic.) 55. 65. 115.**

Natrum bicarbonicum S. 1.

- sulfuricum 47.

Nicotiana Tabacum 56.

Nitrum 12. 36. 50. 63.

Nux Juglandis regiae 106.

- vomica 23.

O.

Oculi Cancrorum 2.

Oleum Amygdal. dulc. 37.

- Crotonis Tigllii 9. 24. 48.

- Lini 55. 66.

- Terebinthinae 25. 34.
56. 84.

Ononis spinosa (rad.) 13.

**Opium 9. 11. 18. 31. 36. 56.
67. 80. 101. 116. 117.
122. 123.**

Oryza sativa 39.

Oxymel 40.

P.

Paeonia (rad.) 2.

Papaver 37. 87. 92.

Paraguay Roux 149.

Passulae majores 14.

Pasta cum chloreto Zinci 134.

- viennensis 118.

Phosphor 66. 122.

Picrotoxin 142.

Pilulae 16.

- adstringentes 16.
- antiarthriticae 22.
- antihelminthicae 19.
- antihydopicae 22.
- anglicae 17.
- asiaticae 129.

- Pilulae contra dolores dentium** S. 148.
 — contra dolores dentium opiatæ 148.
 — Dzondii 100.
 — emmenagogæ 17. 23.
 — c. Ferro arsen. oxydul. (Bielt) 129.
 — ferruginosæ (Canstatt) 21.
 — Heimii 22.
 — martiales 21.
 — mercuriales in nosocom. Julii usitatae 101.
 — resolventes 24.
 — Rufii 25.
 — c. unguento Hydrargyri (Sedillot) 130.
 — Valetii (Valeisii) 20.
Piper Cubebæ 84. 85.
Pix liquida 139.
Plumbum aceticum 9. 89. 94. 95. 132. 133.
 — jodatum 123. 124.
 — tannicum 70.
Polygala Senega 39.
Pommade bei aufgesprungener Haut 153.
 — épilatoire 140.
Potio laxans 44.
 — Riveri 47.
Protojoduretum Hydrarg. 102. 121.
Pseudo-Emulsiones 37.
Pulvis ærophorus 1.
 — — Seidlitzens. 1.
 — alterans Plumeri 2.
- Pulvis antiepileptic. Hufel. S. 2.**
 — — Marchionis 2.
 — — Ragoloi 2.
 — antihelminthicus 3.
 — aromaticus 3.
 — causticus Cosmi 65.
 — dentifricius 147.
 — Doweri comp. 5.
 — — simplex 5.
 — emeticus 5.
 — epilatorius 140.
 — laxans 7.
 — limonade 8.
 — infantum Hufel. 9.
 — resolvens 10.
 — Sellii 11.
 — stomachicus 10.
 — temperans 12.
Punica Granatum (cortex, rad.) 40.
- Q.**
- Quassia** 24.
Quercus (cortex) 93.
- R.**
- Rasura Cornu Cervi** 15. 28. 39.
Ratanhia 41. 94. 105.
Resina Guajaci 22.
 — Jalappæ 22.
 — Mastichis 63. 150.
 — Sandarac 150.
Rheum 4. 9. 10. 11. 24. 27.
Roob de Cuisinier 104.
 — ferruginosus 105.
 — Juniperi 26.
 — de Laffeteur 103.
 — Sambuci 26. 27. 46.

S.

Sabina S. 7.
 Saccharum lactis 39. 52.
 — Saturni vide Plumb. acet-
 ticum.
 Sal amarum vide Magnesia sul-
 furica.
 — ammoniacum 2. 63.
 — de Creuznach 74.
 — essentielle Tartari vide
 Acidum tartaric.
 — marinum 74.
 — mirabile Glauberi vide
 Natrum sulfuric.
 — de Orb 74.
 — thermarum carolinens. 25.
 Salep 29. 39. 41.
 Salicinum 10. 25.
 Salvia 7. 54.
 Santonin 10.
 Sapo domesticus 73.
 — viridis 142.
 Saponaria (radix) 13. 57.
 Sassafra (lignum) 13. 15. 27.
 102.
 Sassaparilla 14. 103 bis 110.
 Senna 8. 26. 27. 44. 105. 107.
 108.
 Senega 39.
 Sera 51.
 Serum lactis acetosum 51.
 — — aluminatum 51.
 — — gramineum 52.
 — — herbaceum 52.
 — — tamarindinat. 52.
 — — tartarisatum edul-
 coratum 51.

Siliqua dulcis S. 14.
 Solutio Ammonii arsenicici
 (Biett) 181.
 — antihæmorrhagica 48.
 — arsenicalis Fowleri 181.
 — Plenckii 119.
 Species 13. 61. 115.
 — antihydripicæ 13.
 — aromaticæ 61.
 — diureticæ Rombergi 13.
 — emollientes herbaceæ 61.
 — — pulverat. 61.
 — lignorum 13.
 — Loweri 14.
 — narcoticæ 62.
 — nervinæ 14.
 — pectorales c. fructibus 14.
 — — ordinariæ 15.
 — pro infantibus 15.
 — sopientes 62.
 Spermacetum 68.
 Spilanthes oleraceus 149.
 Squilla maritima 10. 22. 46.
 Stipites Dulcamaræ 13. 107.
 Stramonium (Dat. sem.) vide
 Tinct.
 Strychnin 11.
 Sulphur aurat. Antimon. 2. 10.
 22.
 — depuratum 8. 11. 17.
 136. 137. 139. 142.
 — stibiatum rubrum 7.
 Syrupus sudorificus (Ricord)
 105.

T.

Tamarindi (fructus) 41. 42. 52.

Tamarindi (pulpa) 26. 27.
 Tanninum 11. 90. 94. 117.
 Taraxacum 41. 57.
 Tartarus depuratus 11. 26. 27.

51.

— emeticus 5. 30. 50. 57.
 70.

— natronatus 1. 37. 44.

— tartarisatus 10.

Terebinthina veneta 38.

Thea Bohea (viridis) 45.

Tinctura aromat. acida 43.

— Cantharidum 118.

— Castorei 34.

— Cinnamomi 33.

— dentifric. c. dol. dent.
 149.

— — sec. Dr. Herz 150.

— de Para 149.

— Opii crocata vide Laud.
 liq. Sydenh.

— Rhei aquosa 47.

— — vinosa 47.

— Stramonii 33.

— Thujae orientalis 118.

— Valerianae spl. 34.

Turpethum minerale vide Hy-
 drarg. sulfuric. oxydat.

U.

Unguenta 67. 120. 136.

Unguentum ad mammas 68.

— ad perniones 67.

— anglicum contra scabiem
 136.

— anodynum 68.

— Authenriethii 70.

Unguentum Authenriethii con-
 tra decubit. S. 70.

— Belladonnae 79. 120.

— Boli alb. sec. Baer. 80.

— ceratum opiatum 67.

— — simplex 67.

— — plumbicum 67.

— contra scabiem sec. Hel-
 merich 137.

— contra scabiem sec. Wil-
 kinson 137.

— de Ferrear 68.

— digestiv. opiat. 120.

— emolliens 68.

— epilatorium 140.

— Haenii contra decubitum
 69.

— Hydrarg. opiat. 122.

— — oxydat. rubr. 122.

— — phosphor. oxydal.
 122.

— Janini 80.

— neapolitanum 80.

— ophthalmic. rubr. (sec.
 Baer) 80.

— opiatum c. Mercurio 80.

— Picrotoxini 142.

— pomadinum chinat. 151.

— pomad. opt. 151.

— saponato-sulfurat. 142.

— sulfurat. c. Saponi vi-
 ridi 142.

— Weikardii contra decu-
 bitum 70.

— Zinci 143.

Urea nitrica 25.

Uva Ursi 6. 45.

V.

Valeriana 2. 9. 14. 43.
Vinum antimōn. Huxhami 33.
— aromaticum 90. 117.
— Colchici sem. 32. 33.
— gallicum 90
— hispanicum 84.
Viscum album 2.


Z.

Zahnkitt 150.
Zahnpillen 148.
Zahnpulver 147.
Zahntincturen 149.
Zincum aceticum 90.
— muriaticum 90 116. 134.
— oxydatum album 2. 12.
143.
— sulfuricum 90. 95. 133.

Verbesserungen.

- S. 22. Nr. 88 2. Z. von unten statt lycododii lies lycopodii.
- 27. Nr. 108. 4. Z. v. u. st. Roob Sambuci $\text{З}\beta$ l. Roob Sambuci $\text{З}\beta$.
- 31. Nr. 119. Z. 15. st. Laenec l. Laennec.
- 36. Nr. 134. 136 u. 137. Z. 3. 10 12. 14 u. 19 ferner
- 37. Z. 1. st. amydalina l. amygdalina.
- 43. Aufschrift st. nfusa l. Infusa.
- 46. Nr. 167. Z. 9. st. Aetheris acet. gr. x. l. Aetheris acet. gtt. x.
- 46. Aufschrift st. Mixturen und Solutiones l. Mixturae et Solutiones.
- 53. Nr. 190. st. Garg. chlorata l. Gargarisma chloratum
- 69. Nr. 35. Taxe. st. 38. l. 18.
- 70. Nr. 36. Z. 2. st. Unquentum l. Unguentum.
- 70. Nr. 36. Z. 2. st. contro l. contra.
- 74. VI. st. arteficial. l. artificial.
- 74. VII. a) Taxe st. 24—26 l. 24—36.
- 75. VII. b) Taxe st. 16—12 l. 16—24.
- 75. X. a) Taxe st. 21—36 l. 12—36.
- 76. X. b) Taxe st. 6—30 l. 12—24.

- S. 77. XV. Taxe st. 12—30. l. 12—24.
- 83. c) 7. Z. v. u. st. Resinae Copaiv. l. Balsami Copaivae.
 - 93. Taxe st. 28 l. 26.
 - 93. Taxe st. 40 l. 35.
 - 95. Taxe st. 34. l. 29.
 - 108. Z. 2. v. o. st. Corticis merzerei l. Corticis mezerei.
 - 149. Nr. 7. Z. 3. st. Spilanthis l. Spilanthi.
-



RECEPT-FORMELN ZUM INNERLICHEN GEBRAUCH.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Pulveres.		
Pulv. c. argento oxydato.		
Rp. Argenti oxydati gr. $\frac{1}{4}$ — $\frac{1}{3}$ — $\frac{1}{2}$.	—	10 11
Sacchari albi $\mathfrak{D}\beta$.		12
Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nr. vi.		
S. Alle 4 Stunden ein Pulver zu nehmen.		
Pulv. chinini ferro-citrici.		
Rp. Chinin. ferro-citric. gr. ii—iii.	—	42 58
Sacchari albi $\mathfrak{D}\beta$.		
Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nr. viii.		
S. Täglich 2—4 mal ein Pulver zu nehmen.		
Pilulae.		
Pilulae artemisiae.		
(Rademacher.)		
Rp. Extract. artemisiae spirituos.	—	19
Pulv. rad. artemis. aa. 3i.		
M. f. massa pil. e qua form. pil. Nr. 60.		
Consp. pulv. liquirit.		
DS. 4 mal täglich 10—12 Stück zu nehmen.		
Pilulae c. Digitalino.		
Rp. Digitalini puri gr. ii.	—	45
Pulv. diatragacanth. 3i.		
Aq. dest. q. s. ut fiant pilulae Nr. 60.		
Consp. lycopod.		
DS. Täglich 1—3 Pillen zu nehmen.		

Formeln.	Taxe	
	fl.	kr.
Pilulae c. Nicotiana. (Rademacher.) Rp. Extr. nicot. rustic. e succo recent. parat. ʒii. Pulv. rad. althaeae q. s. ut fiant pilul. Nr. 120. Consp. pulv. liquirit. DS. Täglich 2—4—8 Pillen zu nehmen.	—	32
Pilulae c. phellandrio aquatico. Rp. Extr. phelland. spir. res. aquos. ʒii. Pulv. rad. althaeae Extract. graminis aa. ʒβ. M. f. massa pil. e qua forment. pilul. Nr. 90. DS. Dreimal täglich 5 Pillen zu nehmen.	—	38
Electuaria. Electuarium ferro-chinatum. (E. roborans.) Rp. Balsami peruv. ʒii—ʒβ. Ferri carbonic. ʒβ. Extract. chiniae Pulv. cort. chin. reg. aa. ʒi. Conservae rosarum ʒii. M. f. electuarium molle. DS. Theelöffelweise.	1 1	9 19
Guttulae. Guttulae e Chinoidino. (Rademacher.) Rp. Chinini sulfurici gr. x. Chinoidini ʒi. Spir. vini rectificat. ʒii. Solve et misce. DS. 4 mal täglich 20 Tropfen zu nehmen.	—	42

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Guttulae e Coniino.</p> <p>Rp. Coniini gtt. ii. Spirit. vini \mathfrak{D}i. Aquae flor. aurant. $\mathfrak{z}\mathfrak{z}$. DS. 5 mal täglich 3 Tropfen zu nehmen.</p>	—	22
<p>Tinctura Dasjespis. (s. Hyracei.)</p> <p>Bereitung.</p> <p>Rp. Hyracei contusi \mathfrak{z}iii. digere calore 24—30° R. cum Aq. destill. \mathfrak{z}xviii per dies octo, saepius conquassando filtra et solutioni adde Aquae destill. q. s. ut pond. sit. \mathfrak{z}xxi. — adde Alcoholis vini (32° D.) \mathfrak{z}iii. M. filtra Rp. Hujus Tincturae \mathfrak{z}ii. S. 10—15 Tropfen auf Zucker zu nehmen.</p>	—	24
<p>Decocta.</p>		
<p>Decoctum antihelminth. c. Kusso.</p> <p>Rp. Summitat. Brayerae antihelminthicae \mathfrak{z}vi—\mathfrak{z}i. infunde aq. font. fervid. \mathfrak{z}xvi et coq. ad colat. \mathfrak{z}viii adde Syrup. cort. aurant. \mathfrak{z}i. MDS. Auf 1 oder 2 mal zu nehmen und dann stündlich 1 Eßlöffel voll Ricinusöl zu nehmen, bis Wirkung erfolgt.</p>	2 2	8 44
<p>Decoct. rhamni frangulae. (Marcus).</p> <p>Rp. Cort. rhamni frang. \mathfrak{z}ii—\mathfrak{z}i. Fiat decoct. Colat. \mathfrak{z}vi adde Syrup. cort. aurant. (seu Zingiberis) \mathfrak{z}i. Zur stärkern Wirkung kann noch</p>	—	20

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Magnes. oder Natr. sulf. $\frac{3}{3}$—$\frac{3}{i}$ zugesetzt werden. MDS. Stündl. 2 Esslöffel voll bis halbtassenweis zu nehmen.</p>	—	24 26
<p>Decoct. scolopendrii. Rp. Herb. scolopendrii $\frac{3}{3}$—$\frac{3}{i}$. Fiat decoct. colat. $\frac{3}{v}$ adde (Lactis vaccin. $\frac{3}{v}$) Syrup. simpl. $\frac{3}{i}$. MDS. Halbtassenweise zu trinken.</p>	—	20 23
Mixturae et Solutiones.		
Mixtura cannabina.		
<p>Rp. Extract. cannabis indic. (Haschisch) $\frac{3}{i}$ solve in Spir. sulfuric. aeth. $\frac{3}{ii}$ Aquae destillat. $\frac{3}{v}$. Syrup. simplicis $\frac{3}{i}$. MDS. Täglich 2—3 mal 1 Theelöffel voll zu nehmen, vorsichtig steigend bis 2—3 Esslöffel voll. In jüngster Zeit mit eclatantem Erfolg bei Tetanus rheumaticus gegeben.</p>	1	15
Solutio Elaterii.		
<p>Rp. Elaterii puri gr. i—ii. solve in Spir. vini q. s. adde Aquae cinnamom. $\frac{3}{iv}$. Syrup. cort. aurant. $\frac{3}{3}$. MDS. Stündlich 1 Löffel voll zu nehmen.</p>	— —	38 41
Clysmata.		
Clyisma ex amylo.		
<p>Rp. Amyli pulver. $\frac{3}{ii}$—$\frac{3}{i}$.</p>		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
M. fiat l. a. Decoct. colat. $\frac{3}{4}$ vj adde Laudan. liq. Sydenhami seu tinct. opii simpl. gtt. v—viii. MDS. Zum Klystir.	—	12
Clyisma ex argento nitrico. Rp. Argenti nitrici crystall. gr. i—v—x solve in Aq. destill. $\frac{3}{4}$ iv. Mucilag. gummi arab. $\frac{3}{4}$ i. MDS. Zum Klystir,	—	18 21 24

RECEPT-FORMELN ZUM AEUSSERLICHEN GEBRAUCH.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Solutiones, Unguenta et Emplastra. Solutio Jodii. Rp. Jodii puri 3ß Kali hydrojodinei 3j. Aqua destillat. ʒiij. MDS. Zum Einspritzen bei der Operation der Hydrocele. Bei grossen Hydrocelen wird die Quantität vergrössert.		
Unguent. argenti nitrici. 1. Rp. Argent. nitric. cryst. ʒj. Olei terebinth. 3iiß. Aqua dest. ʒv. M. D. ad vitrum nigrum. S. Umgeschüttelt auf die Brandstellen aufzustreichen.		
2. (Nach Kalt.) Rp. Argent. nitric. fusi 3ii. Aqua dest. q. s. ad solutionem. Olei lini ʒviii. MDS. Umgeschüttelt mit einem Federbart aufzutragen.		
Unguent. atropini. Rp. Atropini gr. iiii—v in spir. vini solut. Axung. porci ʒiij. M. f. ungt. DS. zum Einreiben.		
Unguent. Carbonei chlorati. Rp. Carbon. chlorat. ʒi. Olei olivarum ʒi. MDS. Zum Einreiben.		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Linimentum de Roche. Rp. Olei terebinth. $\mathfrak{z}\text{i}$ Phosphori gr. viii. Camphor. trit. Olei cumini aa. $\mathfrak{z}\beta$. Olei alcaunae $\mathfrak{z}\text{viii}$. M. f. liniment. DS. Salbe.	$\mathfrak{z}\text{i}$	8
Linimentum de Stockes. Rp. Olei terebinth. $\mathfrak{z}\text{iii}$. Acidi acetici conc. $\mathfrak{z}\beta$. Aqua dest. $\mathfrak{z}\text{i}\beta$. M. c. vitell. ovor. Nr. iii ut fiat emulsio, cui admisce Olei citri $\mathfrak{z}\text{i}$. MDS. Salbe.	$\mathfrak{z}\text{i}$	4
Unguent. Veratrini. Rp. Veratrini gr. x in spir. vini rectific. solut. Axung porci $\mathfrak{z}\text{i}$. MDS. Salbe.	1	9
Emplastrum c. Gummi resin. ammoniaci. Rp. Gummi res. ammoniaci $\mathfrak{z}\text{vi}$. Aceti squill. q. s. ut fiat emplast. molle. DS. Auf weiches Leder gestrichen aufzulegen (bei Hydrarthos).	—	27
Chloroform. (Bereitet nach Carl.) Rp. Calcariae chlorat. ven. \mathfrak{z} 15 p. civ. bav. tere c. aq. font. mens. vi ad pulvem et admisce Alcoholis 84% B. $\mathfrak{z}\text{xxxvi}$. Destilla leni calore et Chloroformum obtentum iteratim aq. comm. conquassando decantha et super calc. muriat. leni calore destilla.	$\mathfrak{z}\text{i}$	30
Collodium. Bereitung. Rp. Lanae displodator. $\mathfrak{z}\text{ii}$ digere c. miscella ex Aeth. sulfurici $\mathfrak{z}\text{iv}$ et Alcoh. vini $\mathfrak{z}\text{ii}$ parat. ad solutionem et cola,	$\mathfrak{z}\text{i}$	20

**RECEPT-FORMELN DER OPHTHALMIATRISCHEN
KLINIK.**

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
Collyria et Unguenta.		
Collyrium argenti nitrici.		
Rp. Argent. nitrici cryst. gr. i—iv. Aquae dest. \mathfrak{z} i.	—	9 12
MDS. 1—2 mal täglich einen oder mehrere Tropfen ins Auge zu träufeln.		
Collyrium Atropini. (Cunier.)		
Rp. Atropini puri gr. v. Aquae dest. \mathfrak{z} i.	1	22
MDS. Einige Tropfen dieser Lösung einzuträufeln, um die Pupille zu erweitern.		
Collyrium Zinci. (Rademacher.)		
Rp. Zinci acetici gr. vi. Aquae destillatae \mathfrak{z} v. — amygdal. amar. \mathfrak{z} i.	—	16
MDS. Augewasser.		
Mucilago tannica. (Chairion.)		
Rp. Tannini puri 5 grammes. Aq. destillatae 20 grammes.		
Wird in einem Mörser gelöst, gummi arab. 10 gramm. zugesetzt, genau gemischt und durch Leinwand geseiht. — Das Präparat muss gleichmässig graulich aussehen, und von Syrup-Consistenz sein. —	—	40
DS. Man taucht einen weichen Pinsel ein und bestreicht damit die Innenfläche des untern Augenlides,		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
lässt die Lider sich schliessen und reibt dann das obere Augenlid von aussen, damit das Mittel sich gleichmässig vertheilt.		
Unguentum jodinicum simpl. Rp. Kali hydrojodini gr. v—x—xv. Butyri Cacao 3i. M. f. ungt. Da ad ollam. S. Augensalbe.	—	12 13 17
Unguent. jodinic. comp. Rp. Kali hydrojodini gr. xv. Extract. conii maculat. 3/3. Unguent. neapolitani 3/3. MDS. Morgens und Abends in die Augenbrauen einzureiben (bei torpider scrophulöser Ophthalmie).	—	22
Unguent. merc. praecip. c. belladonna. Rp. Mercurii praecip. albi gr. vi—xii, Extract. belladonn. 9/3—9i. Axung. porci 3ii. M. f. ungt. DS. Bei heftiger Lichtscheu alle 2—4 Stunden über die Stirne einzureiben.	—	9 11
Unguent. mercur. praecip. rubr. comp. (Arlt.) Rp. Hydrarg. praecip. rubr. gr. ii—iv. Lapidis divini gr. iv—viii. Laud. liquid. Sydenh. gtt. x—xv. (camphorae tritae gr. 3.) Axung. porci 3i. M. f. ungt. D. ad ollam. S. Erbsengrösse Abends auf die äussere Seite, dann an die Ränder, und endlich selbst an die innere Fläche der Augenlider einzureiben (bei hartnäckigem chronischen Augenlider-Catarrh, besonders alter Leute).	—	12

RECEPT-FORMELN DER SYPHILIDO - KLINIK.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
I. Zum innerlichen Gebrauch.		
Sirop de deuto-jodure joduré de mercure. (Gibert.)		
Bi-jodure de mercure 1 gramme.		
Jodure de potassium 50 grammes.		
Eau distillée 50 grammes.		
Solve, filtra et adde syrup. saccharat. (30°)		
2400 grammes.		
Täglich $\frac{1}{2}$ –1–2 Löffel voll zu nehmen.		
(Ein Löffel voll enthält 1 Centigr. bi-jodure de mer- cure und 50 Centigr. Jodure de potassium.)		3i ge- gen 12
Pilulae Zinci. (Rademacher.)		
Rp. Zinci acetici 3ii.		
Pulv. rad. alth.		
Extract. millefolii aa. 3ß.	—	31
Misce, f. mass. pilul. e qua form. Nr. 60.		
DS. Mit 5 Pillen zu beginnen, alle 2–3 Tage um 1 Pille zu steigen, bis 15–20 Stück genommen werden; nebstbei die Solutio zinc. acet. (3i–3ii auf aq. dest. 3i) zum Verband der Schanker.	—	9 12
II. Zum äusserlichen Gebrauch.		
Lotio mercurialis. (Mainoth.)		
Rp. Merc. subl. corros. gr. v.		
Spirit. vini rectificat. 3ii.		
Solve. DS. Alle 3 Stunden mittelst eines Pinsels alle Excoriationen zu bestreichen.	—	7
(Präservativ-Mittel oder Chlorkalk part. i auf aq. 24 part., besonders bei Frauen.)		

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>Litus oris.</p> <p>Rp. Acid. muriat. dil. 3i. Mellis rosat. 3i. MDS. Pinselsaft bei Mercur-Geschwüren auf der Mundschleimbaut.</p>	—	12
<p>Ungt. zinci cum mercurio. (Schätzler.)</p> <p>Rp. Calomelanos ʒi. Zinci oxydat. alb. ʒß. Axung. porci 3i. MDS. 2 mal täglich (bei Condylomen).</p>	—	10
<p>Ungt. lapidis infernalis.</p> <p>Rp. Argent. nitrici fusi ʒß—ʒi. Axung. porci 3ii—3iii. M. f. ungt. DS. (bei indolenten Bubonen).</p>	—	12 19

RECEPT-FORMELN FÜR HAUTKRANKHEITEN.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
I. Zum innerlichen Gebrauch.		
Pilulae succi hurae brasiliensis. (Hebra.) Rp. Succ. hurae brasil. Extr. graminis Pulv. liquiritiae aa. ʒi. M. f. l. a. pilulae Nr. 60. DS. Täglich 1 Pille. (Erregt leicht Brechdurchfall, nach Gibert 1—5 gtt. in einem aromat. Julep.)		
Pilulae Arsen. jodati. Rp. Arsen. jodati gr. ii. Extr. graminis Pulv. liquirit. aa. gr. xxiv. M. f. mass. e qua form. pil. Nr. 24. Consp. pulv. liquirit. DS. Täglich 1 Pille, steigend bis zu 5—6 Stück.		
II. Zum äusserlichen Gebrauch.		
Glycerin - Formeln. (Startin.) 1. Rp. Gummi tragacanth. ʒii—ʒʒ. Aq. calcis ʒʒ. Glycerini pur. ʒi. Aq. rosarum ʒiiiʒ. MDS. (Bei Excoriationen, Intertrigo, aufgesprungen- nen Lippen.)		
	1	46
	1	51

Formeln.	Taxe	
	fl.	kr.
<p>2.</p> <p>Rp. Acidi nitrici dilut. $\frac{3}{\beta}$-3i. Magist. Bismuthi $\frac{3}{\beta}$. Tinct. digitalis 3i. Glycerini puri $\frac{3}{\beta}$-3i. Aq. rosarum $\frac{3}{viii}$. MDS. Zu Waschungen. (Bei Lichen, Strophulus, Prurigo, Lepra, Psoriasis.)</p>	1	7
<p>3.</p> <p>Rp. Boracis venet. $\frac{3}{\beta}$-3i. Glycerini puri $\frac{3}{\beta}$. Aqua rosarum $\frac{3}{viii}$. MDS. Zu Waschungen. (Bei wunden Brustwarzen, Erythema etc.)</p>	1	—
<p>Solutio de Gutta Percha.</p> <p>Rp. Gutt. Perch. 3ii. Solve digest. in Chloroformi $\frac{3}{i}$. DS. Zum Bestreichen. (Bei Eczema rubr.)</p>	—	56
<p>Unguent. mercuriale cum arsenico. (Lee.)</p> <p>Rp. Ungt. mercur. 3ii. Arsenici albi gr. ii. M. f. ungt. DS. Täglich 2mal einzureiben; die darauffolgende Exulceration wird 2-3 Tage unterhalten. (Bei spitzen Condylomen, Warzen, Excrescenzen.)</p>	—	11
<p>Unguent. cum oleo hollandico (aether. chlor.) (Cazenave.)</p> <p>Rp. Olei hollandici 3ii. Axung. porci $\frac{3}{\beta}$. M. f. ungt. D. S. Salbe. (Bei Pruritus der Geni- talien.)</p>	—	56

RECEPT - FORMELN DER KINDER - KLINIK.

Pulveres.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>1. Pulvis antispasmodicus.</p> <p>Rp. Florum Zinci gr. $\frac{1}{8}$—$\frac{1}{2}$. Moschi tonquinensis gr. $\frac{1}{4}$—1. Sacchari lactis gr. v. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nr. viii. S. Alle 2—4 Stunden 1 Pulver zu nehmen.</p>	2	46 34
<p>2. Pulvis Coccionellae.</p> <p>Rp. Coccionellae gr. $\frac{1}{4}$—i. Sacchari lactis gr. v. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nr. viii. S. 3—4 mal täglich 1 Pulver.</p>	—	10 11
<p>3. Pulvis ferruginosus cum Racahout.</p> <p>Rp. Pulveris Racahout des Arabes ʒi. Ferri carbonici ʒi. Misce fiat pulvis, detur ad scatulam. S. Einigemal tägl. eine Messerspitze voll zu nehmen.</p>	—	24
<p>4. Pulvis Ferri et Chinini citrici.</p> <p>Rp. Ferri et Chinini citrici gr. i. Pulveris gummosi gr. vi. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nr. viii. S. Dreimal täglich 1 Pulver zu nehmen.</p>	—	25

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p>5. Pulvis laxans.</p> <p>Rp. Calomelanos Resinae Jalappae praeparatae aa. gr. ii—iii. Pulveris gummosi gr. iv. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nr. iv. S. Zweistündlich 1 Pulver.</p>	—	11 13
<p>6. Pulvis puerorum.</p> <p>Rp. Magnesia carbonicae 3i—3ii. (Radicis rhei 9i.) Seminum Badianae 9ß. Sacchari albi 3ß. Misce fiat pulvis, detur ad scatulam. S. Tägl. 2—3 mal eine Messerspitze voll zu nehmen.</p>	—	15 17
<p>7. Pulvis sulfuris aurati comp. (anticatarrhalis.)</p> <p>Rp. Sulfuris aurati antimonii Calomelanos aa. gr. $\frac{1}{8}$—$\frac{1}{4}$. (Pulveris radialis Ipecacuanhae gr. $\frac{1}{16}$—$\frac{1}{8}$.) Sacchari lactis gr. v. Misce fiat pulvis, dentur tales doses Nr. viii. S. 2—4 mal täglich 1 Pulver zu nehmen.</p>	—	12

Linctus.

Formeln.	Taxe.	
	fl.	kr.
<p style="text-align: center;">8 Linctus amarus. (West.)</p> <p>Rp. Extract. ligni campechiani 3i. Aquae melissae, Syrupi simplicis aa. ʒi. MDS. Theelöffelweise zu nehmen.</p>	—	15
<p style="text-align: center;">9. Linctus ex Argento nitrico. (Trousseau.)</p> <p>Rp. Argenti nitrici crystallisati gr. 1/4—i. Mucilaginis Gummi arabici, Aquae destillatae, Syrupi simplicis aa. ʒi. MD. ad vitrum nigrum. S. Theelöffelweise zu nehmen.</p>	—	19
<p style="text-align: center;">10. Linctus e Cupro sulfurico. (Romberg.)</p> <p>Rp. Cupri sulfurici gr. v. Aquae destillatae q. s. ad solutionem. Mellis despumati ʒi. MDS. Pinselsaft (bei Soot).</p>	—	11
<p style="text-align: center;">11. Linctus emeticus</p> <p>Rp. Tartari emetici gr. β—i.</p>		

Formeln.	Taxè.	
	fl.	kr.
<p>Aquae destillatae, Syrupi Ipecacuanhae aa. \mathfrak{z}i. MDS. Brechsaft. — Bei Säuglingen reicht meist der Syr. ipecacuanh. rein für sich theelöffelweise gegeben hin. —</p>	—	15
<p>12. Linctus ferruginosus. (Mialhe.) Rp. Tartari ferruginosi, Aquae cinnamomi aa. \mathfrak{z}i. Syrupi simplicis \mathfrak{z}i. MDS. 2—3mal täglich 1 Theelöffel voll. NB. Dieser Linctus zersetzt sich nicht so leicht, als der Seite 33 (s. oben) angegebene Jodeisensyrup.</p>	—	12

Inhalt der Nachträge.

Recept-Formeln zum innerlichen Gebrauch.

	Seite
Pulvres.	
Pulv. c. argento oxydato	3
— chinini ferro citrici	—
Pilulae.	
Pilulae artemisiae	—
— c. digitalino	—
— c. nicotiana	4
— c. phellandrio aquatico	—
Electuaria.	
Electuarium ferro-chinatum	—
Guttulae.	
Guttulae e Chinoidino	—
— e Coniino	5
Tinctura Dasjespie	—
Decocta.	
Decoctum antihelminth. c. Kusso	—
— rhamni frangulae	—
— scolopendrii	6
Mixturae et Solutiones.	
Mixtura cannabina	—
Solutio Elaterii	—
Clysmata.	
Clyisma ex amylo	—
— ex argento nitrico	7

Recept-Formeln zum äusserlichen Gebrauch.

Solutiones, Unguenta et Emplastra.	
Solutio Jodii	11
Unguent. argenti nitrici	—
— atropini	—
— Carbonei chlorati	—
Linimentum de Roche	12
— de Stokes	—
Unguent. Veratrini	—
Emplastrum c. Gummi resin. ammoniaci	—
Chloroform	—
Colloidum	—

Recept-Formeln der ophthalmiatischen Klinik.

Collyria et Unguenta.

Collyrium argenti nitrici	15
— Atropini	—
— Zinci	—
Mucilago tannica	—
Unguentum jodinicum simpl.	16
— jodinic. comp.	—
— merc. praecip. c. belladonna	—
— — rubr. comp.	—

Recept-Formeln der Syphilito-Klinik.

I. Zum innerlichen Gebrauch.

Syrop de deuto-jodure jodure de mercure	19
Pilulae Zinci	—

II. Zum äusserlichen Gebrauch.

Lotio mercurialis	—
Litus oris	20
Ungt. zinci cum mercurio	—
— lapidis infernalis	—

Recept-Formeln für Hautkrankheiten.

I. Zum innerlichen Gebrauch.

Pilulae succi burae brasiliensis	23
— Arsen. jodati	—

II. Zum äusserlichen Gebrauch.

Glycerin-Formeln 1	—
— — 2 und 3	24
Solutio de Gutta Percha	—
Unguent. mercuriale cum arsenico	—
— cum oleo hollandico (aether. chlor.)	—

Recept-Formeln der Kinder-Klinik.

Pulveres.

1. Pulvis antispasmodicus	27
2. Pulvis Coccionellae	—
3. Pulvis ferruginosus cum Racahout	—
4. — Ferri et Chinini citrici	—
5. — laxans	28
6. — puerorum	—
7. — sulphuris aurati comp.	—

Linctus.

8. Linctus amarus	29
9. — ex Argento nitrico	—
10. — e Cupro sulphurico	—
11. — emeticus	—
12. — ferruginosus	30

RS125 Reuss, A.

66719

R44 Recept-taschenbuch... hrsg.

1852 von Reuss u. Carl. 2. ausgabe

ST

66719

Library of the
University of California Medical School
and Hospitals

1m-9,'25

